

|    |     |
|----|-----|
| 癌種 | 大腸癌 |
|----|-----|

|        |                    |
|--------|--------------------|
| プロトコル名 | Bmab7.5mg/kg+XELOX |
|--------|--------------------|

| 抗癌剤と支持療法 | 一般名  | 投与量                            | 投与方法 | 投与時間 | 投与日   | 備考                            |
|----------|--|--------------------------------|------|------|-------|-------------------------------|
| 1        | カペシタビン錠                                      | C法                             | 内服   |      | d1-14 | 1日目の夕食後から15日目の朝食後まで内服         |
| 2        | パロノセトロン注<br>デキサメサゾン注<br>クロルフェニラミン注<br>ラニチジン注 | 0.75mg<br>6.6mg<br>5mg<br>50mg | 点滴   | 30分  | d1    |                               |
| 3        | ペバシズマブ                                       | 7.5mg/kg                       | 点滴   | 90分  | d1    | 初回90分点滴。2回目60分、3回目以降30分まで短縮可。 |
| 4        | オキサリプラチン                                     | 130mg/m <sup>2</sup>           | 点滴   | 2時間  | d1    |                               |
| 5        |  |                                |      |      |       |                               |
| 6        |  |                                |      |      |       |                               |
| 7        |  |                                |      |      |       |                               |
| 8        |  |                                |      |      |       |                               |
| 9        |  |                                |      |      |       |                               |
| 10       |  |                                |      |      |       |                               |
| 11       |  |                                |      |      |       |                               |
| 12       |  |                                |      |      |       |                               |

|      |      |
|------|------|
| 投与間隔 | 21日毎 |
|------|------|

|     |  |
|-----|--|
| その他 |  |
|-----|--|