

		Day1	Day15	クール終了日 Day28
抗がん剤	注射・内服・処置	<b>■---【注射】</b> 生理食塩液 20mL … 1管 プライミング用  グラニセロン点滴静注液3mgバッグ「アイロム」… 1袋 テキサート注射液 6.6mg … 1瓶 (30)分点滴  生理食塩液 500mL … 1袋 イリリテカン【化療】 (90)分点滴  生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用  生理食塩液 20mL … 1管 フラッシュ用	<b>■---【注射】</b> 生理食塩液 20mL … 1管 プライミング用  グラニセロン点滴静注液3mgバッグ「アイロム」… 1袋 テキサート注射液 6.6mg … 1瓶 (30)分点滴  生理食塩液 500mL … 1袋 イリリテカン【化療】 (90)分点滴  生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用  生理食塩液 20mL … 1管 フラッシュ用	
		<b>■---【投薬】</b> S-1【化療】 1日2回 朝・夕 食後 点滴した日の夕食後から服用して下さい。15日目の 朝食後までです。  テカトロン錠 0.5mg … 1回 4錠 1日2回 朝・昼 食後 抗がん剤点滴翌日から3日間飲んでください。	<b>■---【投薬】</b> テカトロン錠 0.5mg … 1回 4錠 1日2回 朝・昼 食後 抗がん剤点滴翌日から3日間飲んでください。	
S-1:80mg/m <sup>2</sup> d1-14 IRI: 125mg/m <sup>2</sup> d1,15				