

| | | | クール終了日 |
|--|----------|---|--------|
| | | Day1 | Day14 |
| 抗がん剤 | 注射・内服・処置 | <p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 20mL … 1管 プライミング用</p> <p>アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg … 1袋 デキサト注射液 6.6mg … 1瓶 ホラミン注 5mg … 1管 (30)分点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用</p> <p>生理食塩液 250mL … 1袋 サイラムザ【化療】 (60)分点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 (15)分点滴</p> <p>生理食塩液 250mL … 1袋 イリテカン【化療】 … 999mg (2)時間点滴 レボホリナートと同時滴下</p> <p>生理食塩液 250mL … 1袋 レボホリナート【化療】 (2)時間点滴 イリテカンと同時滴下</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フルオロウラシル注【化療】 … 999mg 全開で点滴</p> <p>フルオロウラシル注【化療】インフューザSV2.5用 生食 mL用(充填用) … 100mL (46)時間点滴</p> <p>ロック用生食注シリンジ 10mL … 1筒 フラッシュ用</p> | |
| | | <p>■---【投薬】</p> <p>デカトロン錠 0.5mg … 1回 4錠 1日2回 朝・昼 食後 抗がん剤点滴開始翌日から3日間飲んでください。</p> | |
| <p>Ramucirumab:8mg/kg d1 IRI: 150mg/m² d1 I-LV:200mg/m² d1 5-FU(bolus):400mg/m² d1 5-FU(infusion):2400mg/m² d1</p> | | | |