

S-1+q3wHER

				クール終了日
		Day1	Day22	Day42
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【注射】 生理食塩液 100mL … 1瓶 ファモチジン静注 20mg「日新」 20mL … 1管 テキサート注射液 6.6mg … 1瓶 (30)分点滴 生理食塩液 250mL … 1瓶 ハーセプチン【化療】 (90)分点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■---【注射】 生理食塩液 100mL … 1瓶 ファモチジン静注 20mg「日新」 20mL … 1管 テキサート注射液 6.6mg … 1瓶 (30)分点滴 生理食塩液 250mL … 1瓶 ハーセプチン【化療】 (90)分点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	
		■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠	
		■---【投薬】 S-1【化療】 1日2回 朝・夕 食後 1日目の夕食後から29日目の朝食後まで内服してください。		
		S-1:80mg/m ² d1-28 Her:初回8mg/kg, 2回目以降6mg/kg d1,22(点滴時間は添付文書の規定に従う)		