

R2(square)(#2~5)

			ケール終了日
		Day1	Day28
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>ソリューゲンF注 500mL … 1瓶 メインルートで点滴終了まで</p> <p>リツキシマブ注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) 50 ml/h (30)分点滴 100 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(50)mL/hずつ上げる 最大400mL/hまで</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管より</p>	
		<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコ-7錠 10mg … 5錠 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」 … 1錠</p> <p>■---【投薬】</p> <p>(毒・C)レプラミト<sup>®</sup>カプセル 5mg【化療】 … 4C 1日 夕 食後 抗がん剤点滴1日目の夕食後から内服を 開始してください。 3週内服1週休薬</p>	
<p>リツキシマブ:375mg/m<sup>2</sup> d1,8,15,22(#1), d1(#2~5)(点滴時間は添付文書の規定に従う) レナリドミド:20mg/body d1-21</p>			