

分子標的治療剤皮膚障害の予防・治療フローチャート ver.1.0

初回導入時

スキンケア（保湿・保清・保護）を指導

【導入時に必要に応じて以下の薬剤を予防的に処方】

保湿剤：ヒルドイドソフト軟膏 or パスタロンソフト or 市販の低刺激保湿剤(顔面、手指に予防的に塗布)

外用ステロイド：【顔面】ロコイド軟膏(1日2回) 【頭皮】リンデロンVローション(1日2回)

【体幹・四肢】マイザー or リンデロンV軟膏 (1日2回)

内服薬：ミノマイシン錠100～200mg/日


症状出現時の対応

ざ瘡様皮膚炎

頭部 | 顔面/頸部 | 体幹/四肢


○外用ステロイド

Strong リンデロンV ローション	Medium ロコイド キンダベート	Strong～ very strong リンデロン マイザー
---------------------------	--------------------------	---



○外用ステロイド

Very strong ～strongest アンテベート デルモベート トスカルブ	Strong～ very strong リンデロンV	Very strong ～strongest マイザー デルモベート
--	----------------------------------	---



軽症
Grade
0～1

中等症
Grade2

重症
Grade3

○テトラサイクリンorマクロライド抗菌剤
MINO100～200mg/日
RXM300mg/日

○抗がん剤の休薬を検討
(必要に応じて短期ステロイド内服)

皮膚乾燥

○保湿剤
・ヘパリン類似物質
(ヒルドイドローション/ソフト)
・尿素配合
(パスタロンローション/ソフト)
・市販の保湿剤
(ベビー用など低刺激のもの)

○必要に応じてステロイド外用剤の併用を検討する。

○抗がん剤の休薬を検討
+頻回保湿外用剤を使用

亀裂・角化

○保湿剤
・ヘパリン類似物質
(ヒルドイドローション/ソフト)
・尿素配合
(パスタロンローション/ソフト)
・市販の保湿剤
(ベビー用など低刺激のもの)

○皮膚潰瘍治療薬
(亜鉛華軟膏)

○保湿剤+外用ステロイド
Very strong～strongest
マイザー
デルモベート

○皮膚潰瘍治療薬
亜鉛華軟膏
(ステロイド+亜鉛華軟膏の重層法)

○亀裂の保護
・手袋
・ハイドロコロイドドレッシング剤

○抗がん剤の休薬を検討
+保湿・ステロイド塗布を継続

爪囲炎

○外用ステロイド
Strong～very strong
リンデロンV
マイザー軟膏

○洗浄
(保護と泡で洗浄を指導)

○ステロイド外用
Very strong～strongest
マイザー
デルモベート軟膏

○二次感染
内服抗菌剤(MINO)
外用抗菌剤(ダラシンTゲル)

○爪の処理
(爪の切り方・テーピング指導)

○抗がん剤の休薬を検討
+ステロイド塗布を継続

そう痒感が強い場合：内服抗ヒスタミン薬の処方を検討

上記の対策を行っても改善しない場合は皮膚科医に相談