

			クール終了日
		Day1	Day14
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 20mL … 1管 プライミング用</p> <p>パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg … 1袋 デキサト注射液 6.6mg … 1瓶 ファミジン静注 20mg「日新」 20mL … 1管 ホラミン注 5mg … 1管 (30)分点滴</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 アバスタ【化療】 (90)分点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用</p> <p>5%ブドウ糖 250mL … 1袋 オキサリプラチン【化療】 (2)時間点滴 レボホリナートと同時滴下</p> <p>5%ブドウ糖 250mL … 1袋 レボホリナート【化療】 (2)時間点滴 レボホリナートと同時滴下</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フルオウラシル注【化療】</p> <p>フルオウラシル注【化療】インフューザSV2.5用 生食 mL用(充填用) … 100mL (46)時間点滴</p> <p>ロック用生食注シリンジ 10mL … 1筒 フラッシュ用</p>	
		<p>■---【投薬】</p> <p>デカロン錠 0.5mg … 1回 4錠 1日2回 朝・昼 食後 抗がん剤点滴開始翌日から3日間飲んでください。</p>	
<p>Bmab:5(10)mg/kg d1 (点滴時間は添付文書の規定に従う) L-OHP:85mg/m² d1 I-LV:200mg/m² d1 5-FU(bolus):400mg/m² d1 5-FU(infusion):2400mg/m² d1</p>			