

2回目以降 Cmab 250mg m²+FOLFIRI

				クール終了日
		Day1	Day8	Day14
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【注射】 生理食塩液 20mL … 1管 プライミング用 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg … 1袋 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 ポラミン注 5mg … 1管 (30)分点滴 生理食塩液 250mL … 1袋 アービタックス【化療】 (60)分点滴 生理食塩液 100mL … 1瓶 (60)分点滴 生理食塩液 250mL … 1袋 イリノテカン【化療】 (2)時間点滴 レボホリナートと同時滴下 生理食塩液 250mL … 1袋 レボホリナート【化療】 (2)時間点滴 イリノテカンと同時滴下 生理食塩液 50mL … 1瓶 フルオロウラシル注【化療】 全開で点滴 フルオロウラシル注【化療】インフューザSV2.5用 生食 mL用(充填用) … 100mL (46)時間点滴 ロック用生食注シリンジ 10mL … 1筒 フラッシュ用	■---【注射】 生理食塩液 20mL … 1管 プライミング用 生理食塩液 100mL … 1瓶 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 ポラミン注 5mg … 1管 (30)分点滴 生理食塩液 250mL … 1袋 アービタックス【化療】 (60)分点滴 生理食塩液 100mL … 1瓶 (60)分点滴 ロック用生食注シリンジ 10mL … 1筒 フラッシュ用	
		■---【投薬】 デカロン錠 0.5mg … 1回 4錠 1日2回 朝・昼 食後 抗がん剤点滴開始翌日から3日間飲んでください。 3日		
Cmab:初回400mg/㎡、2回目以降250mg/㎡（点滴時間は添付文書の規定に従う） IRI: 150mg/㎡ I-LV:200mg/㎡ 5-FU(bolus):400mg/㎡ 5-FU(infusion):2400mg/㎡				