

		クール終了日
		Day1
		Day14
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【注射】 生理食塩液 20mL … 1管 プライミング用 パロ/セトロン点滴静注バッグ 0.75mg … 1袋 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 ボラミン注 5mg … 1管 (30)分点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 生理食塩液 250mL … 1袋 サイラムザ【化療】 (60)分点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 (15)分点滴 生理食塩液 250mL … 1袋 イリノテカン【化療】 … 999mg (2)時間点滴 レボホリナートと同時滴下 生理食塩液 250mL … 1袋 レボホリナート【化療】 (2)時間点滴 イリノテカンと同時滴下 生理食塩液 50mL … 1瓶 フルオロウラシル注【化療】 … 999mg 全開で点滴 フルオロウラシル注【化療】インフューザSV2.5用 生食 mL用(充填用) … 100mL (46)時間点滴 ロック用生食注シリンジ 10mL … 1筒 フラッシュ用
		■---【投薬】 デカトロン錠 0.5mg … 1回 4錠 1日2回 朝・昼 食後 抗がん剤点滴開始翌日から3日間飲んでください。
Ramucirumab:8mg/kg d1 IRI: 150mg/m ² d1 I-LV:200mg/m ² d1 5-FU(bolus):400mg/m ² d1 5-FU(infusion):2400mg/m ² d1		