

				クール終了日
		Day1	Day15	Day28
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【注射】 生理食塩液 20mL … 1管 プライミング用 グラニセロン点滴静注液3mgバック「アイロム」 … 1袋 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 (30)分点滴 生理食塩液 500mL … 1袋 イリノテカン【化療】 (90)分点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 生理食塩液 20mL … 1管 フラッシュ用	■---【注射】 生理食塩液 20mL … 1管 プライミング用 グラニセロン点滴静注液3mgバック「アイロム」 … 1袋 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 (30)分点滴 生理食塩液 500mL … 1袋 イリノテカン【化療】 (90)分点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 生理食塩液 20mL … 1管 フラッシュ用	
		■---【投薬】 S-1【化療】 1日2回 朝・夕 食後 点滴した日の夕食後から服用して下さい。15日目の 朝食後までです。 デカドン錠 0.5mg … 1回 4錠 1日2回 朝・昼 食後 抗がん剤点滴翌日から3日間飲んでください。	■---【投薬】 デカドン錠 0.5mg … 1回 4錠 1日2回 朝・昼 食後 抗がん剤点滴翌日から3日間飲んでください。	
S-1:80mg/㎡ d1-14 IRI:125mg/㎡ d1,15				