

		Day1	Day15
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【注射】 生理食塩液 20mL … 1管 プライミング用 グラニセロン点滴静注液3mgバッグ「アイロム」 … 1袋 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 (30)分点滴 生理食塩液 100mL … 1瓶 ペクティックス注【化療】 (1)時間点滴 生理食塩液 100mL … 1瓶 (60)分点滴 生理食塩液 500mL … 1袋 イリナテカン【化療】 (90)分点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 生理食塩液 20mL … 1管 フラッシュ用	■---【注射】 生理食塩液 20mL … 1管 プライミング用 グラニセロン点滴静注液3mgバッグ「アイロム」 … 1袋 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 (30)分点滴 生理食塩液 100mL … 1瓶 ペクティックス注【化療】 (1)時間点滴 生理食塩液 100mL … 1瓶 (60)分点滴 生理食塩液 500mL … 1袋 イリナテカン【化療】 (90)分点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 生理食塩液 20mL … 1管 フラッシュ用
		■---【投薬】 S-1【化療】 1日2回 朝・夕 食後 1日目の夕食後から15日目の朝食後まで内服してください。 デカドン錠 0.5mg … 1回 4錠 1日2回 朝・昼 食後 抗がん剤点滴翌日から3日間飲んでください。	■---【投薬】 デカドン錠 0.5mg … 1回 4錠 1日2回 朝・昼 食後 抗がん剤点滴翌日から3日間飲んでください。
Pmab:6mg/kg d1 S-1:80mg/m ² d1-14 IRI:125mg/m ² d1,15			

[illegible]