

Bmab7.5mg kg+SOX

			クール終了日
		Day1	Day21
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【注射】 生理食塩液 20mL … 1管 プライミング用 ハロ/セトロン点滴静注バッグ 0.75mg … 1袋 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 ボラミン注 5mg … 1管 ファモチジン静注 20mg「日新」 20mL … 1管 (30)分点滴 アバスタチン【化療】 生理食塩液 100mL … 1瓶 (90)分点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 オキサリプラチン【化療】 5%ブドウ糖注バッグ「フソー」 500mL … 1袋 (2)時間点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 生理食塩液 20mL … 1管 フラッシュ用	
		■---【投薬】 S-1【化療】 1日2回 朝・夕 食後 点滴した日の夕食後から服用して下さい。15日目の朝食後までです。 デカロン錠 0.5mg … 1回 4錠 1日2回 朝・昼 食後 抗がん剤点滴翌日から3日間飲んでください。	
		Bmab:7.5mg/kg d1 (点滴時間は添付文書の規定に従う) S-1:80mg/㎡ d1-14 L-OHP:130mg/㎡ d1	