

Bmab7.5mg kg+SOX

			クール終了日
		Day1	Day21
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 20mL … 1管 プライミング用</p> <p>パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg … 1袋 デキサト注射液 6.6mg … 1瓶 ボラミン注 5mg … 1管 ファモチジン静注 20mg「日新」20mL … 1管 (30)分点滴</p> <p>アバスタチン【化療】 生理食塩液 100mL … 1瓶 (90)分点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用</p> <p>オキサリプラチン【化療】 5%ブドウ糖注バッグ「フソー」 500mL … 1袋 (2)時間点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用</p> <p>生理食塩液 20mL … 1管 フラッシュ用</p>	
		<p>■---【投薬】</p> <p>S-1【化療】 1日2回 朝・夕 食後 点滴した日の夕食後から服用して下さい。15日目の朝食後までです。</p> <p>デカトロン錠 0.5mg … 1回 4錠 1日2回 朝・昼 食後 抗がん剤点滴翌日から3日間飲んでください。</p>	
Bmab:7.5mg/kg d1 (点滴時間は添付文書の規定に従う) S-1:80mg/m ² d1-14 L-OHP:130mg/m ² d1			