

			クール終了日
		Day1	Day14
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【注射】 生理食塩液 20mL … 1管 プライミング用 パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg … 1袋 テキサート注射液 6.6mg … 1瓶 ファモチジン静注用 50mg … 1管 ホラミン注 5mg … 1管 (30)分点滴 5%ブドウ糖注バッグ「フソー」 500mL … 1袋 イリノテカン【化療】 (90)分点滴 5%ブドウ糖液 250mL … 1瓶 オキサリプラチン【化療】 (2)時間点滴 レボホリナートと同時滴下 5%ブドウ糖液 250mL … 1瓶 レボホリナート【化療】 (2)時間点滴 オキサリプラチンと同時滴下 フルオウラシル注【化療】インフューザSV2.5用 生食 mL用(充填用) … 100mL (46)時間点滴 ロック用生食注シリンジ 10mL … 1筒 フラッシュ用	
		■---【投薬】 アプレピタントカプセル 80mg「サワイ」 … 1C 1日1回 朝食後 抗癌剤点滴開始2日目と3日目の朝食後に飲んでください。	
		■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 アプレピタントカプセル 125mg「サワイ」 … 1C 抗癌剤点滴の1～1.5時間前に内服してください。	
		IRI:150mg/m ² d1 L-OHP:85mg/m ² d1 I-LV:200mg/m ² d1 5-FU:2400mg/m ² d1	