

			クール終了日
		Day1	Day14
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 20mL … 1管 プライミング用</p> <p>パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg … 1袋 デキサト注射液 6.6mg … 1瓶 ファモチジン静注用 50mg … 1管 ポラミン注 5mg … 1管 (30)分点滴</p> <p>5%ブドウ糖注バッグ「フソー」 500mL … 1袋 イリリテカン【化療】 (90)分点滴</p> <p>5%ブドウ糖液 250mL … 1瓶 オキサリプラチン【化療】 (2)時間点滴 レボホリナートと同時滴下</p> <p>5%ブドウ糖液 250mL … 1瓶 レボホリナート【化療】 (2)時間点滴 オキサリプラチンと同時滴下</p> <p>フルオロウラシル注【化療】インフューサ®SV2.5用 生食 mL用(充填用) … 100mL (46)時間点滴</p> <p>ロック用生食注シリンジ® 10mL … 1筒 フラッシュ用</p>	
		<p>■---【投薬】</p> <p>アプレピタントカプセル 80mg「サワイ」 … 1C 1日1回 朝食後 抗癌剤点滴開始2日目と3日目の朝食後に飲んでください。</p>	
		<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分 アプレピタントカプセル 125mg「サワイ」 … 1C 抗癌剤点滴の1~1.5時間前に内服してください。</p>	
<p>IRI:150mg/m<sup>2</sup> d1 L-OHP:85mg/m<sup>2</sup> d1 I-LV:200mg/m<sup>2</sup> d1 5-FU:2400mg/m<sup>2</sup> d1</p>			