## Bmab 5(10)mg kg + IRIS

|      |          |   |  | クール終  |
|------|----------|---|--|-------|
| •    |          | Day1  | Day15  | Day28 |
|      |          | ■【注射】   | ■【注射】  |       |
|      |          | 生理食塩液 20mL ··· 1管<br>プライミング用                                | 生理食塩液 20mL … 1管<br>ブライミング用                                   |       |
|      |          | n n n l l l l l n n l l l l l l l l l l                     | パロ/セトロン点滴静注パッグ 0.75mg … 1袋<br>デキサート注射液 6.6mg … 1瓶<br>(30)分点滴 |       |
|      | 注射·内服·処置 | 生理食塩液 100mL … 1瓶<br>アパスチン【化療】<br>(90)分点滴                    | 生理食塩液 100mL … 1瓶<br>アパスチン[化療]<br>(90)分点滴                     |       |
| 抗がん剤 |          | 生理食塩液 500mL … 1袋<br>イリテカン 【化療】<br>(90) 分点滴                  | 生理食塩液 500mL … 1袋<br>イリ/テかン 【化療】<br>(90) 分点滴                  |       |
|      |          | 生理食塩液 50mL ··· 1瓶<br>フラッシュ用                                 | 生理食塩液 50mL … 1瓶<br>フラッシュ用                                    |       |
|      |          | 生理食塩液 20mL ··· 1管<br>フラッシュ用                                 | 生理食塩液 20mL … 1管<br>フラッシュ用                                    |       |
|      |          | ■[投薬]   | ■【投薬】  |       |
|      |          | S-1【化療】<br>  1日2回 朝・夕 食後<br>  1日目の夕食後から15日目の朝食後まで内服してください。  | テかロン錠 0.5mg … 1回 4錠<br>1日2回 朝・昼 食後<br>抗がん剤点滴翌日から3日間飲んでください。  |       |
|      |          | デルロン錠 0.5mg … 1回 4錠<br>1日2回 朝・昼 食後<br>抗がん剤点滴翌日から3日間飲んでください。 |  |       |