

		Day1	Day8	クール終了日
		Day1	Day8	Day14
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 20mL … 1管 プライミング用</p> <p>アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg … 1袋 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 ホラムシ注 5mg … 1管 ファモチジン静注 20mg「日新」 20mL … 1管 (30)分点滴</p> <p>生理食塩液 250mL … 1袋 アービタックス【化療】 (1)時間点滴</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 (60)分点滴</p> <p>5%ブドウ糖 250mL … 1袋 オキサリプラチン【化療】 (2)時間点滴 レボホリナートと同時滴下</p> <p>5%ブドウ糖 250mL … 1袋 レボホリナート【化療】 (2)時間点滴 オキサリプラチンと同時滴下</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フルオウラシル注【化療】 全開で点滴</p> <p>フルオウラシル注【化療】インフューサ`SV2.5用 生食 mL用(充填用) … 100mL (?)時間点滴 … 46</p> <p>ロック用生食注シリンジ 10mL … 1筒 フラッシュ用</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 20mL … 1管 プライミング用</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 ホラムシ注 5mg … 1管 (30)分点滴</p> <p>生理食塩液 250mL … 1袋 アービタックス【化療】 (60)分点滴</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 (1)時間点滴</p> <p>ロック用生食注シリンジ 10mL … 1筒 フラッシュ用</p>	
		<p>■---【投薬】</p> <p>デキサロン錠 0.5mg … 1回 4錠 1日2回 朝・昼 食後 抗がん剤点滴開始翌日から3日間飲んでください。</p>		
<p>Cmab:初回400mg/m²、2回目以降250mg/m² d1 (点滴時間は添付文書の規定に従う) L-OHP:85mg/m² d1 I-LV:200mg/m² d1 5-FU(bolus):400mg/m² d1 5-FU(infusion):2400mg/m² d1</p>				