

		クール終了日	
		Day1	Day21
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg … 1袋                      テキサト注射液 6.6mg … 3瓶                      ファモチジン静注 20mg「日新」20mL … 1管                      (30)分点滴</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶                      アパスチン【化療】                      (90)分点滴</p> <p>生理食塩液 500mL … 1袋                      パクリタキセル【化療】                      (3)時間点滴</p> <p>5%ブドウ糖液 250mL … 1瓶                      カルボプラチン【化療】                      (1)時間点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶                      フラッシュ用                      全開で点滴可</p>	
		<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分                      レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠                      パクリタキセル開始30分前に内服してください。</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分                      アプレヒタントカプセル 125mg「サワイ」 … 1C</p>	
		<p>■---【投薬】</p> <p>アプレヒタントカプセル 80mg「サワイ」 … 1C                      1日 朝食後                      抗がん剤点滴翌日から2日間内服してください。</p>	
Bmab:15mg/kg d1 (点滴時間は添付文書の規定に従う) CBDCA:AUC=6 d1 PTX:175mg/m <sup>2</sup> d1			