

AP療法

					クール終了日
		Day1	Day2	Day3	Day21
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【注射】 ハロノセロン点滴静注バッグ 0.75mg … 1袋 デキサート注射液 3.3mg … 1管 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 (30)分点滴 ドキソビリン塩酸塩注【化療】 生理食塩液 50mL … 1瓶 全開で点滴可 生理食塩液 50mL … 1瓶 ドキソビリン投与後のフラッシュ用 全開で点滴可 ソルデム3A 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液 (1mEq/mL) 20mL … 0.2管 (60)分点滴 マンニトールS注射液 300mL … 1袋 (30)分点滴 シスプラチン【化療】 生理食塩液 500mL … 0.8袋 (60)分点滴 ソルデム3A 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液 (1mEq/mL) 20mL … 0.2管 (60)分点滴	■---【注射】 生理食塩液 100mL … 1瓶 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 30分点滴 ソルデム3A 500mL … 1袋 (60)分点滴	■---【注射】 生理食塩液 100mL … 1瓶 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 30分点滴 ソルデム3A 500mL … 1袋 (60)分点滴	
		■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分C … 1 アフレビタントカプセル 125mg「サワイ」 … 1C 抗がん剤点滴1～1.5時間前に内服してください			
		■---【投薬】 アフレビタントカプセル 80mg「サワイ」 … 1C 1日 朝 食後 抗がん剤点滴翌日から2日間内服してください 2日			
		CDDP:50mg/㎡ d1 DXR:60mg/㎡ d1 21日毎			