

qwPTX+Bmab

					ケール終了日
		Day1	Day8	Day15	Day28
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【注射】 グラニセロン点滴静注バッグ 3mg「HK」… 1袋 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 ファモチジン静注 20mg「日新」20mL … 1管 (30)分点滴 パクリタキセル【化療】 生理食塩液 250mL … 1袋 (60)分点滴 要専用ルート 生理食塩液 50mL … 1瓶 パクリタキセル投与後のフラッシュ用 全開で点滴可 アパスチン点滴静注用【化療】 生理食塩液 100mL … 1瓶 (90)分点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 アパスチン投与後のフラッシュ用 全開で点滴可	■---【注射】 グラニセロン点滴静注バッグ 3mg「HK」… 1袋 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 ファモチジン静注 20mg「日新」20mL … 1管 (30)分点滴 パクリタキセル【化療】 生理食塩液 250mL … 1袋 (60)分点滴 要専用ルート 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■---【注射】 グラニセロン点滴静注バッグ 3mg「HK」… 1袋 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 ファモチジン静注 20mg「日新」20mL … 1管 (30)分点滴 パクリタキセル【化療】 生理食塩液 250mL … 1袋 (60)分点滴 要専用ルート 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	
		■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分C … 1 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠 化学療法30分前に服用して下さい	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分C … 1 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠 化学療法30分前に服用して下さい	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分C … 1 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠 化学療法30分前に服用して下さい	
		PTX:80mg/m ² d1,8,15 Bmab:15mg/kg d1 21日毎 (点滴時間は添付文書の規定に従う)			