

qwPTX+Bmab

		ケール終了日			
		Day1	Day8	Day15	Day28
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>グラニセロン点滴静注バッグ 3mg「HK」… 1袋 デキサト注射液 6.6mg … 1瓶 ファモチジン静注 20mg「日新」 20mL … 1管 (30)分点滴</p> <p>パクリタキセル【化療】 生理食塩液 250mL … 1袋 (60)分点滴 要専用ルート</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 パクリタキセル投与後のフラッシュ用 全開で点滴可</p> <p>アバスタチン点滴静注用【化療】 生理食塩液 100mL … 1瓶 (90)分点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 アバスタチン投与後のフラッシュ用 全開で点滴可</p>	<p>■---【注射】</p> <p>グラニセロン点滴静注バッグ 3mg「HK」… 1袋 デキサト注射液 6.6mg … 1瓶 ファモチジン静注 20mg「日新」 20mL … 1管 (30)分点滴</p> <p>パクリタキセル【化療】 生理食塩液 250mL … 1袋 (60)分点滴 要専用ルート</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p>	<p>■---【注射】</p> <p>グラニセロン点滴静注バッグ 3mg「HK」… 1袋 デキサト注射液 6.6mg … 1瓶 ファモチジン静注 20mg「日新」 20mL … 1管 (30)分点滴</p> <p>パクリタキセル【化療】 生理食塩液 250mL … 1袋 (60)分点滴 要専用ルート</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p>	
		<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分C … 1 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠 化学療法30分前に服用して下さい</p>	<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分C … 1 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠 化学療法30分前に服用して下さい</p>	<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分C … 1 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠 化学療法30分前に服用して下さい</p>	
<p>PTX:80mg/m² d1,8,15 Bmab:15mg/kg d1 21日毎 (点滴時間は添付文書の規定に従う)</p>					