

GEM+Bmab

					クール終了日
		Day1	Day8	Day15	Day28
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【注射】 グラニセロン点滴静注バッグ 3mg「HK」… 1袋 デキサート注射液 3.3mg … 1管 30分点滴 ゲムシタビン注【化療】 生理食塩液 100mL … 1瓶 30分点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 ゲムシタビン投与後のフラッシュ用 全開で点滴可 アバスタチン点滴静注用【化療】 生理食塩液 100mL … 1瓶 (90)分点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 アバスタチン投与後のフラッシュ用 全開で点滴可	■---【注射】 グラニセロン点滴静注バッグ 3mg「HK」… 1袋 デキサート注射液 3.3mg … 1管 30分点滴 ゲムシタビン注【化療】 生理食塩液 100mL … 1瓶 30分点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■---【注射】 グラニセロン点滴静注バッグ 3mg「HK」… 1袋 デキサート注射液 3.3mg … 1管 30分点滴 ゲムシタビン注【化療】 生理食塩液 100mL … 1瓶 30分点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	
		GEM:1000mg/m ² d1,8,15 Bmab:15mg/kg d1 28日毎 (点滴時間は添付文書の規定に従う)			