

GEM+Bmab

					クール終了日
		Day1	Day8	Day15	Day28
抗がん剤	注射・内服・処置	<b>■---【注射】</b> グラニセロン点滴静注バッグ 3mg「HK」… 1袋 テキサート注射液 3.3mg… 1管 30分点滴  <b>ゲムシタビン注【化療】</b> 生理食塩液 100mL… 1瓶 30分点滴  生理食塩液 50mL… 1瓶 ゲムシタビン投与後のフラッシュ用 全開で点滴可  <b>アバスタチン点滴静注用【化療】</b> 生理食塩液 100mL… 1瓶 (90)分点滴  生理食塩液 50mL… 1瓶 アバスタチン投与後のフラッシュ用 全開で点滴可	<b>■---【注射】</b> グラニセロン点滴静注バッグ 3mg「HK」… 1袋 テキサート注射液 3.3mg… 1管 30分点滴  <b>ゲムシタビン注【化療】</b> 生理食塩液 100mL… 1瓶 30分点滴  生理食塩液 50mL… 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	<b>■---【注射】</b> グラニセロン点滴静注バッグ 3mg「HK」… 1袋 テキサート注射液 3.3mg… 1管 30分点滴  <b>ゲムシタビン注【化療】</b> 生理食塩液 100mL… 1瓶 30分点滴  生理食塩液 50mL… 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	
		GEM:1000mg/m <sup>2</sup> d1,8,15 Bmab:15mg/kg d1 28日毎 (点滴時間は添付文書の規定に従う)			