qwPTX+Bmab

| | | | | | クール終了日 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Day1 | Day8 | Day15 | Day28 |
| | | | | | |
| 抗がん剤 | 注射・内服・処置 | ■---【注射】<br><br>ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 3mg「HK」 … 1袋<br>ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液 6.6mg … 1瓶<br>ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注 20mg「日新」 20mL … 1管<br>(30)分点滴<br><br>ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ【化療】<br>生理食塩液 250mL … 1袋<br>(60)分点滴<br>要専用ルート<br><br>生理食塩液 50mL … 1瓶<br>ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ投与後のﾌﾗｯｼｭ用<br>全開で点滴可<br><br>ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注用【化療】<br>生理食塩液 100mL … 1瓶<br>(90)分点滴<br><br>生理食塩液 50mL … 1瓶<br>ｱﾊﾞｽﾁﾝ投与後のﾌﾗｯｼｭ用<br>全開で点滴可 | ■---【注射】<br><br>ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 3mg「HK」 … 1袋<br>ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液 6.6mg … 1瓶<br>ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注 20mg「日新」 20mL … 1管<br>(30)分点滴<br><br>ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ【化療】<br>生理食塩液 250mL … 1袋<br>(60)分点滴<br>要専用ルート<br><br>生理食塩液 50mL … 1瓶<br>フラッシュ用<br>全開で点滴可 | ■---【注射】<br><br>ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 3mg「HK」 … 1袋<br>ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液 6.6mg … 1瓶<br>ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注 20mg「日新」 20mL … 1管<br>(30)分点滴<br><br>ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ【化療】<br>生理食塩液 250mL … 1袋<br>(60)分点滴<br>要専用ルート<br><br>生理食塩液 50mL … 1瓶<br>フラッシュ用<br>全開で点滴可 | |
| | | ■---【処置】<br>外来化学療法関連院内渡し分C … 1<br>ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 10mg … 5錠<br>化学療法30分前に服用して下さい | ■---【処置】<br>外来化学療法関連院内渡し分C … 1<br>ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 10mg … 5錠<br>化学療法30分前に服用して下さい | ■---【処置】<br>外来化学療法関連院内渡し分C … 1<br>ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 10mg … 5錠<br>化学療法30分前に服用して下さい | |
| PTX:80mg/㎡ d1,8,15<br>Bmab:15mg/kg d1<br>21日毎<br>(点滴時間は添付文書の規定に従う) | | | | | |