

		クール終了日			
		Day1	Day2	Day3	Day21
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 イミフィンジのプライミング用 全開で点滴可</p> <p>イミフィンジ 点滴静注【化療】 … 1500mg 生理食塩液 250mL … 1袋 (60)分点滴 要専用ルート</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 イミフィンジ投与後のフラッシュ用 全開で点滴可</p> <p>グラニセロン点滴静注パック 3mg「HK」 … 1袋 デキサート注射液 1.65mg … 1管 デキサート注射液 3.3mg … 1管 (30)分点滴</p> <p>生理食塩液 500mL … 1袋 エトホソド注【化療】 (90)分点滴</p> <p>5%ブドウ糖 250mL … 1袋 カルボプラチン【化療】 (1)時間点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 カルボプラチンのフラッシュ用 全開で点滴可</p>	<p>■---【注射】</p> <p>グラニセロン点滴静注パック 3mg「HK」 … 1袋 デキサート注射液 1.65mg … 1管 デキサート注射液 3.3mg … 1管 (30)分点滴</p> <p>生理食塩液 500mL … 1袋 エトホソド注【化療】 (90)分点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p>	<p>■---【注射】</p> <p>グラニセロン点滴静注パック 3mg「HK」 … 1袋 デキサート注射液 1.65mg … 1管 デキサート注射液 3.3mg … 1管 (30)分点滴</p> <p>生理食塩液 500mL … 1袋 エトホソド注【化療】 (90)分点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p>	
		<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分C … 1 アプレビタントカプセル 125mg「サワイ」 … 1C エトホソド点滴開始1～1.5時間前に内服してください。</p>			
		<p>■---【投薬】</p> <p>アプレビタントカプセル 80mg「サワイ」 … 1C 1日 朝食後 抗がん剤点滴2日目から内服してください。 2日</p>			
<p>Durval:1500mg/body d1(Bw30kg以下は20mg/kg) CBDCA:AUC=5~6 d1 ETP:100mg/m² d1-3 21日毎</p>					