

				クール終了日
		Day1	Day22	Day42
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【注射】 生理食塩液 50mL … 1瓶 全開で点滴可 オプジーホ®のプライミング用 オプジーホ®【化療】… 360mg 生理食塩液 100mL … 1瓶 30 分間以上かけて 要専用ルート 生理食塩液 50mL … 1瓶 30分点滴 オプジーホ®投与後に ヤーホイ点滴静注【化療】 生理食塩液 50mL … 0.6瓶 30分点滴 要専用ルート 生理食塩液 50mL … 1瓶 30分点滴 ヤーホイ投与後に グラニセロン点滴静注バッグ 3mg「HK」… 1袋 テキサート注射液 3.3mg … 1管 テキサート注射液 1.65mg … 1管 (30)分点滴 ペメトレキセド【化療】 生理食塩液 100mL … 1瓶 (10)分点滴 カルボプラチン【化療】 5% ブドウ糖 250mL … 1袋 (1)時間点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 カルボプラチンのフラッシュ用 全開で点滴可	■---【注射】 生理食塩液 50mL … 1瓶 全開で点滴可 オプジーホ®のプライミング用 オプジーホ®【化療】… 360mg 生理食塩液 100mL … 1瓶 30 分間以上かけて 要専用ルート 生理食塩液 50mL … 1瓶 30分点滴 オプジーホ®投与後に グラニセロン点滴静注バッグ 3mg「HK」… 1袋 テキサート注射液 3.3mg … 1管 テキサート注射液 1.65mg … 1管 (30)分点滴 ペメトレキセド【化療】 生理食塩液 100mL … 1瓶 (10)分点滴 カルボプラチン【化療】 5% ブドウ糖 250mL … 1袋 (1)時間点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 カルボプラチンのフラッシュ用 全開で点滴可	
		■---【投薬】 アプレピタントカプセル 80mg「サワイ」… 1C 1日 朝 食後 抗がん剤点滴翌日から2日間内服してください 2日	■---【投薬】 アプレピタントカプセル 80mg「サワイ」… 1C 1日 朝 食後 抗がん剤点滴翌日から2日間内服してください 2日	
		■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分C … 1 アプレピタントカプセル 125mg「サワイ」… 1C ペメトレキセド投与1～1.5時間前に内服してください。	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分C … 1 アプレピタントカプセル 125mg「サワイ」… 1C ペメトレキセド投与1～1.5時間前に内服してください。	
		Nivo:360mg/body d1,22 Ipi:1mg/kg d1 PEM:500mg/m ² d1,22 CBDCA:AUC=5~6 d1,22 42日毎		