

				クール終了日
		Day1	Day22	Day42
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 全開で点滴可 オブジーホのプライミング用</p> <p>オブジーホ【化療】… 360mg 生理食塩液 100mL … 1瓶 30分間以上かけて 要専用ルート</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 30分点滴 オブジーホ投与後に</p> <p>ヤーホイ点滴静注【化療】 生理食塩液 50mL … 0.6瓶 30分点滴 要専用ルート</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 30分点滴 ヤーホイ投与後に</p> <p>グラニセロン点滴静注バッグ 3mg「HK」… 1袋 デキサート注射液 3.3mg … 1管 デキサート注射液 1.65mg … 1管 (30)分点滴</p> <p>ペメトレキセド【化療】 生理食塩液 100mL … 1瓶 (10)分点滴</p> <p>カルボプラチン【化療】 5%ブドウ糖 250mL … 1袋 (1)時間点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 カルボプラチンのフラッシュ用 全開で点滴可</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 全開で点滴可 オブジーホのプライミング用</p> <p>オブジーホ【化療】… 360mg 生理食塩液 100mL … 1瓶 30分間以上かけて 要専用ルート</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 30分点滴 オブジーホ投与後に</p> <p>グラニセロン点滴静注バッグ 3mg「HK」… 1袋 デキサート注射液 3.3mg … 1管 デキサート注射液 1.65mg … 1管 (30)分点滴</p> <p>ペメトレキセド【化療】 生理食塩液 100mL … 1瓶 (10)分点滴</p> <p>カルボプラチン【化療】 5%ブドウ糖 250mL … 1袋 (1)時間点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 カルボプラチンのフラッシュ用 全開で点滴可</p>	
		<p>■---【投薬】</p> <p>アブレタントカプセル 80mg「サワイ」… 1C 1日 朝食後 抗がん剤点滴翌日から2日間内服してください 2日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>アブレタントカプセル 80mg「サワイ」… 1C 1日 朝食後 抗がん剤点滴翌日から2日間内服してください 2日</p>	
		<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分C … 1 アブレタントカプセル 125mg「サワイ」… 1C ペメトレキセド投与1~1.5時間前に内服してください。</p>	<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分C … 1 アブレタントカプセル 125mg「サワイ」… 1C ペメトレキセド投与1~1.5時間前に内服してください。</p>	
<p>Nivo:360mg/body d1,22 Ipi:1mg/kg d1 PEM:500mg/m² d1,22 CBDCA:AUC=5⁶ d1,22 42日毎</p>				