

				クール終了日
		Day1	Day22	Day42
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【注射】 生理食塩液 50mL … 1瓶 全開で点滴可 オプジーボのプライミング用 オプジーボ【化療】… 360mg 生理食塩液 100mL … 1瓶 30 分間以上かけて 要専用ルート 生理食塩液 50mL … 1瓶 30分点滴 オプジーボ投与後に ヤーホイ点滴静注【化療】 生理食塩液 50mL … 0.6瓶 30分点滴 要専用ルート 生理食塩液 50mL … 1瓶 30分点滴 ヤーホイ投与後に グラニセロン点滴静注バッグ 3mg「HK」… 1袋 デキサト注射液 6.6mg … 3瓶 ファモチシン静注 20mg「日新」20mL … 1管 (30)分点滴 生理食塩液 500mL … 1袋 パクリタキセル【化療】 (3)時間点滴 要専用ルート 5% ブドウ糖 250mL … 1袋 カルボプラチン【化療】 (1)時間点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 カルボプラチンのフラッシュ用 全開で点滴可	■---【注射】 生理食塩液 50mL … 1瓶 全開で点滴可 オプジーボのプライミング用 オプジーボ【化療】… 360mg 生理食塩液 100mL … 1瓶 30 分間以上かけて 要専用ルート 生理食塩液 50mL … 1瓶 30分点滴 オプジーボ投与後に グラニセロン点滴静注バッグ 3mg「HK」… 1袋 デキサト注射液 6.6mg … 3瓶 ファモチシン静注 20mg「日新」20mL … 1管 (30)分点滴 生理食塩液 500mL … 1袋 パクリタキセル【化療】 (3)時間点滴 要専用ルート 5% ブドウ糖 250mL … 1袋 カルボプラチン【化療】 (1)時間点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 カルボプラチンのフラッシュ用 全開で点滴可	
		■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分C … 1 アプレビタントカプセル 125mg「サワイ」… 1C パクリタキセル投与1～1.5時間前に内服 外来化学療法関連院内渡し分C … 1 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠 パクリタキセル投与30分前に内服してください。	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分C … 1 アプレビタントカプセル 125mg「サワイ」… 1C パクリタキセル投与1～1.5時間前に内服 外来化学療法関連院内渡し分C … 1 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠 パクリタキセル投与30分前に内服してください。	
		■---【投薬】 アプレビタントカプセル 80mg「サワイ」… 1C 1日 朝 食後 抗がん剤点滴翌日から2日間内服してください 2日	■---【投薬】 アプレビタントカプセル 80mg「サワイ」… 1C 1日 朝 食後 抗がん剤点滴翌日から2日間内服してください 2日	
		Nivo:360mg/body d1,22 Ipi:1mg/kg d1 PTX:200mg/m ² d1,22 CBDCA:AUC=6 d1,22 42日毎		