

		クール終了日		
		Day1	Day22	
		Day42		
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 全開で点滴可 オプジーボのプライミング用</p> <p>オプジーボ【化療】… 360mg 生理食塩液 100mL … 1瓶 30 分間以上かけて 要専用ルート</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 30分点滴 オプジーボ投与後に</p> <p>ヤーホイ点滴静注液【化療】 生理食塩液 50mL … 0.6瓶 30分点滴 要専用ルート</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 30分点滴 ヤーホイ投与後に</p> <p>グラニセロン点滴静注ハッグ 3mg「HK」… 1袋 デキサート注射液 6.6mg … 3瓶 ファモチジン静注 20mg「日新」20mL … 1管 (30)分点滴</p> <p>生理食塩液 500mL … 1袋 ハクリタキセル【化療】 (3)時間点滴 要専用ルート</p> <p>5% ブドウ糖 250mL … 1袋 カルボプラチン【化療】 (1)時間点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 カルボプラチンのフラッシュ用 全開で点滴可</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 全開で点滴可 オプジーボのプライミング用</p> <p>オプジーボ【化療】… 360mg 生理食塩液 100mL … 1瓶 30 分間以上かけて 要専用ルート</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 30分点滴 オプジーボ投与後に</p> <p>グラニセロン点滴静注ハッグ 3mg「HK」… 1袋 デキサート注射液 6.6mg … 3瓶 ファモチジン静注 20mg「日新」20mL … 1管 (30)分点滴</p> <p>生理食塩液 500mL … 1袋 ハクリタキセル【化療】 (3)時間点滴 要専用ルート</p> <p>5% ブドウ糖 250mL … 1袋 カルボプラチン【化療】 (1)時間点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 カルボプラチンのフラッシュ用 全開で点滴可</p>	
		<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分C … 1 アプレヒタントカプセル 125mg「サワイ」… 1C バクリタキセル投与1～1.5時間前に内服 外来化学療法関連院内渡し分C … 1 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠 バクリタキセル投与30分前に内服してください。</p>	<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分C … 1 アプレヒタントカプセル 125mg「サワイ」… 1C バクリタキセル投与1～1.5時間前に内服 外来化学療法関連院内渡し分C … 1 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠 バクリタキセル投与30分前に内服してください。</p>	
		<p>■---【投薬】</p> <p>アプレヒタントカプセル 80mg「サワイ」… 1C 1日 朝食後 抗がん剤点滴翌日から2日間内服してください 2日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>アプレヒタントカプセル 80mg「サワイ」… 1C 1日 朝食後 抗がん剤点滴翌日から2日間内服してください 2日</p>	
<p>Nivo:360mg/body d1,22 Ipi:1mg/kg d1 PTX:200mg/m² d1,22 CBDCA:AUC=6 d1,22 42日毎</p>				