

CDDP+S-1 (short hydration)

				クール終了日
		Day1	Day8	Day35
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【投薬】 S-1【化療】… 999mg 1日2回 朝・夕 食後 1日目の夕食後から22日目の朝食後まで 内服してください。 21日	■---【注射】 ハロノセロン点滴静注バッグ 0.75mg … 1袋 デキサート注射液 3.3mg … 1管 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 (30)分点滴 ソルデム3A 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液 (1mEq/mL) 20mL … 0.2管 (60)分点滴 マンニトールS注射液 300mL … 1袋 (30)分点滴 生理食塩液 500mL … 0.8袋 シスプラチン【化療】 (60)分点滴 ソルデム3A 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液 (1mEq/mL) 20mL … 0.2管 (60)分点滴	
			■---【投薬】 アプレビタントカプセル 80mg「サワイ」… 1C 1日 朝 食後 抗癌剤点滴翌日から2日間内服してください。 2日 デキロン錠 0.5mg … 8錠 1日2回 朝・昼 食後 抗癌剤点滴翌日から3日間内服してください。 3日	
			■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分C … 1 アプレビタントカプセル 125mg「サワイ」… 1C シスプラチンの1～1.5時間前に内服してください。	
		S-1:80mg/m ² d1-21 CDDP:60mg/m ² d8 35日毎		