

CDDP+S-1 (short hydration)

		Day1	Day8	クール終了日 Day35
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【投薬】</p> <p>S-1【化療】… 999mg 1日2回 朝・夕 食後 1日目の夕食後から22日目の朝食後まで 内服してください。 21日</p>	<p>■---【注射】</p> <p>パロセトロン点滴静注パック 0.75mg … 1袋 デキサト注射液 3.3mg … 1管 デキサト注射液 6.6mg … 1瓶 (30)分点滴</p> <p>ソルテム3A 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液 (1mEq/mL) 20mL … 0.2管 (60)分点滴</p> <p>マンニトールS注射液 300mL … 1袋 (30)分点滴</p> <p>生理食塩液 500mL … 0.6袋 シスプラチン【化療】 (60)分点滴</p> <p>ソルテム3A 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液 (1mEq/mL) 20mL … 0.2管 (60)分点滴</p>	
			<p>■---【投薬】</p> <p>アプレピタントカプセル 80mg「サワイ」… 1C 1日 朝食後 抗癌剤点滴翌日から2日間内服してください。 2日 デキサメタゾン錠 0.5mg … 8錠 1日2回 朝・昼 食後 抗癌剤点滴翌日から3日間内服してください。 3日</p>	
			<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分C … 1 アプレピタントカプセル 125mg「サワイ」… 1C シスプラチンの1～1.5時間前に内服してください。</p>	
<p>S-1:80mg/m<sup>2</sup> d1-21 CDDP:60mg/m<sup>2</sup> d8 35日毎</p>				