

			クール終了日
		Day1	Day21
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【注射】 生理食塩液 20mL … 1管 プライミング用 生理食塩液 50mL … 1瓶 全開で点滴可 オプジーボ投与前に 生理食塩液 100mL … 1瓶 オプジーボ【化療】 … 360mg 30 分間以上かけて 要専用ルート 生理食塩液 50mL … 1瓶 全開で点滴可 オプジーボ投与後のフラッシュ用 ハロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg「タイホウ」 … 1袋 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 ホラミン注 5mg … 1管 ファモチジン静注 20mg「日新」 20mL … 1管 (30)分点滴 オキサリプラチン【化療】 5%ブドウ糖注バッグ「フソー」 500mL … 1袋 (2)時間点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 全開で点滴可 オキサリプラチン投与後のフラッシュ用 ヘパリンNaロック用シリンジ 10mL(100単位) … 1筒 フラッシュ用	
		■---【投薬】 S-1【化療】 1日2回 朝・夕 食後 点滴した日の夕食後から服用して下さい。15日目の朝食後までです。 14日 デカドン錠 0.5mg … 1回 4錠 1日2回 朝・昼 食後 抗がん剤点滴翌日から3日間飲んでください。 3日	
Nivo:360mg/body d1 S-1:80mg/㎡ d1-14 L-OHP:130mg/㎡ d1 21日毎			