

		クール終了日	
		Day1	
		Day21	
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg … 1袋 デキサト注射液 6.6mg … 1瓶 ホラミン注 5mg … 1管 ファモチジン静注 20mg「日新」 20mL … 1管 (30)分点滴</p> <p>5%ブドウ糖注バッグ「フソー」 500mL … 1袋 オキサリプラチン【化療】 (2)時間点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 全開で点滴可 フラッシュ用</p> <p>生理食塩液 250mL … 1袋 ハーセプチン【化療】 (90)分点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 全開で点滴可 フラッシュ用</p>	
		<p>■---【投薬】</p> <p>C)カペタシン錠300mgトール【化療】 1日2回 朝・夕 食後 点滴した日の夕食後から服用して下さい。15日目の朝食後までです。 14日 デカロン錠 0.5mg … 4錠 1日2回 朝・昼 食後 抗がん剤点滴翌日から3日間飲んでください。 3日</p>	
<p>カペタシン:1000mg/m²/回 d1夕-d15朝 L-OHP:130mg/m² d1 Her:初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg d1 (点滴時間は各薬剤の添付文書の規定に従う) 3週毎</p>			