

XELOX+q3wHer(胃癌)

			クール終了日
		Day1	Day21
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg … 1袋 テキサト注射液 6.6mg … 1瓶 ホラミン注 5mg … 1管 ファモチジン静注 20mg「日新」 20mL … 1管 (30)分点滴</p> <p>5%ブドウ糖注バッグ「フソー」 500mL … 1袋 オキサリプラチン【化療】 (2)時間点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 全開で点滴可 フラッシュ用</p> <p>生理食塩液 250mL … 1袋 ハーセプチン【化療】 (90)分点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 全開で点滴可 フラッシュ用</p>	
		<p>■---【投薬】</p> <p>(C)セロータ錠 300mg【化療】 1日2回 朝・夕 食後 点滴した日の夕食後から服用して下さい。15日目の朝食後 までです。</p> <p>デカロン錠 0.5mg … 1回 4錠 1日2回 朝・昼 食後 抗がん剤点滴翌日から3日間飲んでください。</p>	
<p>カペシタビン:C法 d1-14 L-OHP:130mg/m² d1 Her:初回8mg/kg, 2回目以降6mg/kg d1(点滴時間は添付文書の規定に従う)</p>			