R-IDEA

| | | | | | | | クール終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day21 |
| | | | | | | | |
| 抗がん剤 | 注射・内服・処置 | ■---【注射】<br>ヴィーンF輸液 500mL … 1袋<br>メインルートで点滴終了まで<br><br>ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞBS注【化療】<br>生理食塩液　mL用(希釈専用)<br>25 ml/h<br>(30)分点滴<br>50 ml/h<br>(30)分点滴<br>以降、30分毎に(25)mL/hずつ上げる<br>最大200ml/hまで<br><br>生理食塩液 50mL … 1瓶<br>フラッシュ用<br>全開で点滴可<br>ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ終了後側管からﾌﾗｯｼｭ | ■---【注射】<br>ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋<br>メインルートで<br>(6)時間点滴<br><br>ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋<br>メインルートで<br>(6)時間点滴<br><br>ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋<br>メインルートで<br>(6)時間点滴<br><br>ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋<br>メインルートで<br>(6)時間点滴<br><br>ﾊﾞﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg「ﾀｲﾎｳ … 1袋<br>ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液 6.6mg … 5瓶<br>(30)分点滴<br>側管より<br><br>生理食塩液 500mL … 1袋<br>ｲﾎﾏｲﾄﾞ【化療】<br>2時間点滴<br>側管より<br><br>ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注 400mg … 1管<br>ｲﾎﾏｲﾄﾞ開始時<br>ゆっくり静注<br><br>ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注 400mg … 1管<br>ｲﾎﾏｲﾄﾞ開始後4時間<br>ゆっくり静注<br><br>ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注 400mg … 1管<br>ｲﾎﾏｲﾄﾞ開始後8時間<br>ゆっくり静注<br><br>5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖注ﾊﾞｯｸﾞ「ﾌｿｰ」 500mL … 1袋<br>5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液　100mL … 1瓶<br>ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ注【化療】<br>(2)時間点滴<br>側管より<br><br>生理食塩液 50mL … 1瓶<br>フラッシュ用<br>全開で点滴可<br>ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ終了後側管からﾌﾗｯｼｭ | ■---【注射】<br>ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋<br>メインルートで<br>(6)時間点滴<br><br>ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋<br>メインルートで<br>(6)時間点滴<br><br>ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋<br>メインルートで<br>(6)時間点滴<br><br>ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋<br>メインルートで<br>(6)時間点滴<br><br>生理食塩液 50mL … 1瓶<br>ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液 6.6mg … 5瓶<br>(30)分点滴<br>10時のｼﾀﾗﾋﾞﾝ投与前<br><br>5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖 250mL … 1袋<br>ｼﾀﾗﾋﾞﾝ【化療】<br>10時に<br>側管から<br>1時間点滴<br><br>生理食塩液 500mL … 1袋<br>ｲﾎﾏｲﾄﾞ【化療】<br>2時間点滴<br>側管より<br><br>ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注 400mg … 1管<br>ｲﾎﾏｲﾄﾞ開始時<br>ゆっくり静注<br><br>ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注 400mg … 1管<br>ｲﾎﾏｲﾄﾞ開始後4時間<br>ゆっくり静注<br><br>ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注 400mg … 1管<br>ｲﾎﾏｲﾄﾞ開始後8時間<br>ゆっくり静注<br><br>5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖注ﾊﾞｯｸﾞ「ﾌｿｰ」 500mL … 1袋<br>5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液　100mL … 1瓶<br>ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ注【化療】<br>(2)時間点滴<br>側管より<br><br>生理食塩液 50mL … 1瓶<br>ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ注射用 100mg … 1瓶<br>22時のｼﾀﾗﾋﾞﾝ投与前<br><br>5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖 250mL … 1袋<br>ｼﾀﾗﾋﾞﾝ【化療】<br>22時に<br>側管から<br>(1)時間点滴<br><br>生理食塩液 50mL … 1瓶<br>フラッシュ用<br>全開で点滴可<br>ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ終了後側管からﾌﾗｯｼｭ<br><br>生理食塩液 50mL … 1瓶<br>フラッシュ用<br>全開で点滴可<br>22時のｼﾀﾗﾋﾞﾝ終了後側管からﾌﾗｯｼｭ | ■---【注射】<br>ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋<br>メインルートで<br>(6)時間点滴<br><br>ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋<br>メインルートで<br>(6)時間点滴<br><br>ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋<br>メインルートで<br>(6)時間点滴<br><br>ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋<br>メインルートで<br>(6)時間点滴<br><br>生理食塩液 50mL … 1瓶<br>ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液 6.6mg … 5瓶<br>(30)分点滴<br>10時のｼﾀﾗﾋﾞﾝ投与前<br><br>5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖 250mL … 1袋<br>ｼﾀﾗﾋﾞﾝ【化療】<br>10時に<br>側管から<br>1時間点滴<br><br>生理食塩液 500mL … 1袋<br>ｲﾎﾏｲﾄﾞ【化療】<br>2時間点滴<br>側管より<br><br>ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注 400mg … 1管<br>ｲﾎﾏｲﾄﾞ開始時<br>ゆっくり静注<br><br>ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注 400mg … 1管<br>ｲﾎﾏｲﾄﾞ開始後4時間<br>ゆっくり静注<br><br>ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注 400mg … 1管<br>ｲﾎﾏｲﾄﾞ開始後8時間<br>ゆっくり静注<br><br>5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖注ﾊﾞｯｸﾞ「ﾌｿｰ」 500mL … 1袋<br>5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液　100mL … 1瓶<br>ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ注【化療】<br>(2)時間点滴<br>側管より<br><br>生理食塩液 50mL … 1瓶<br>ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ注射用 100mg … 1瓶<br>22時のｼﾀﾗﾋﾞﾝ投与前<br><br>5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖 250mL … 1袋<br>ｼﾀﾗﾋﾞﾝ【化療】<br>22時に<br>側管から<br>(1)時間点滴<br><br>生理食塩液 50mL … 1瓶<br>フラッシュ用<br>全開で点滴可<br>ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ終了後側管からﾌﾗｯｼｭ<br><br>生理食塩液 50mL … 1瓶<br>フラッシュ用<br>全開で点滴可<br>22時のｼﾀﾗﾋﾞﾝ終了後側管からﾌﾗｯｼｭ | ■---【注射】<br><br>生理食塩液 50mL … 1瓶<br>ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液 6.6mg … 5瓶<br>(30)分点滴 | |
| | | ■---【処置】<br>外来化学療法関連院内渡し分<br>ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 10mg … 5錠<br>ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠 60mg「武田ﾃﾊﾞ」 … 1錠<br>リツキシマブ開始30分前に内服 | ■---【投薬】<br>ﾌﾙﾒﾄﾛﾝ点眼液(0.1%)5mL/本 … 1本<br>1日(4)回<br>両眼に点眼<br>シタラビン点滴終了翌日まで両眼に点眼してください。 | | | | |
| ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ:375mg/㎡ d1(投与速度は添付文書の規定に従う)<br>IFM:1300mg/㎡ d2-4<br>DEXA:39.6mg/body d2-5<br>VP-16:150mg/㎡ d2-4<br>Ara-C:750mg*2回/㎡d3-4 | | | | | | | |