

		Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	クール終了日 Day21
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>グリーン糖液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで</p> <p>リツキシマブBS注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) 25 mL/h (30)分点滴 50 mL/h (30)分点滴 以降、30分毎に(25)mL/hずつ上げる 最大200mL/hまで</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 リツキシマブ終了後側管からフラッシュ</p>	<p>■---【注射】</p> <p>ウルデム3A 500mL … 1袋 メインルートで (6)時間点滴</p> <p>ウルデム3A 500mL … 1袋 メインルートで (6)時間点滴</p> <p>ウルデム3A 500mL … 1袋 メインルートで (6)時間点滴</p> <p>ウルデム3A 500mL … 1袋 メインルートで (6)時間点滴</p> <p>ウルデム3A 500mL … 1袋 メインルートで (6)時間点滴</p> <p>ハロセトド点滴静注ハッグ【アイネ】 … 1袋 デキサイト注射液 6.6mg … 5瓶 (30)分点滴 側管より</p> <p>生理食塩液 500mL … 1袋 アイネド 【化療】 2時間点滴 側管より</p> <p>ウロチキサン注 400mg … 1管 イネイト開始時 ゆっくり静注</p> <p>ウロチキサン注 400mg … 1管 イネイト開始後4時間 ゆっくり静注</p> <p>ウロチキサン注 400mg … 1管 イネイト開始後8時間 ゆっくり静注</p> <p>5%ブドウ糖注ハッグ【アイネ】 500mL … 1袋 5%ブドウ糖液 100mL … 1瓶 イネイト注 【化療】 (2)時間点滴 側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 イネイト終了後側管からフラッシュ</p>	<p>■---【注射】</p> <p>ウルデム3A 500mL … 1袋 メインルートで (6)時間点滴</p> <p>ウルデム3A 500mL … 1袋 メインルートで (6)時間点滴</p> <p>ウルデム3A 500mL … 1袋 メインルートで (6)時間点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 デキサイト注射液 6.6mg … 5瓶 (30)分点滴 10時のシタピン投与前</p> <p>5%ブドウ糖 250mL … 1袋 シタピン 【化療】 10時に 側管から 1時間点滴</p> <p>生理食塩液 500mL … 1袋 イネイト 【化療】 2時間点滴 側管より</p> <p>ウロチキサン注 400mg … 1管 イネイト開始時 ゆっくり静注</p> <p>ウロチキサン注 400mg … 1管 イネイト開始後4時間 ゆっくり静注</p> <p>ウロチキサン注 400mg … 1管 イネイト開始後8時間 ゆっくり静注</p> <p>5%ブドウ糖注ハッグ【アイネ】 500mL … 1袋 5%ブドウ糖液 100mL … 1瓶 イネイト注 【化療】 (2)時間点滴 側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 ウルコース注射液 100mg … 1瓶 22時のシタピン投与前</p> <p>5%ブドウ糖 250mL … 1袋 シタピン 【化療】 22時に 側管から (1)時間点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 イネイト終了後側管からフラッシュ</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 22時のシタピン終了後側管からフラッシュ</p>	<p>■---【注射】</p> <p>ウルデム3A 500mL … 1袋 メインルートで (6)時間点滴</p> <p>ウルデム3A 500mL … 1袋 メインルートで (6)時間点滴</p> <p>ウルデム3A 500mL … 1袋 メインルートで (6)時間点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 デキサイト注射液 6.6mg … 5瓶 (30)分点滴 10時のシタピン投与前</p> <p>5%ブドウ糖 250mL … 1袋 シタピン 【化療】 10時に 側管から 1時間点滴</p> <p>生理食塩液 500mL … 1袋 イネイト 【化療】 2時間点滴 側管より</p> <p>ウロチキサン注 400mg … 1管 イネイト開始時 ゆっくり静注</p> <p>ウロチキサン注 400mg … 1管 イネイト開始後4時間 ゆっくり静注</p> <p>ウロチキサン注 400mg … 1管 イネイト開始後8時間 ゆっくり静注</p> <p>5%ブドウ糖注ハッグ【アイネ】 500mL … 1袋 5%ブドウ糖液 100mL … 1瓶 イネイト注 【化療】 (2)時間点滴 側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 ウルコース注射液 100mg … 1瓶 22時のシタピン投与前</p> <p>5%ブドウ糖 250mL … 1袋 シタピン 【化療】 22時に 側管から (1)時間点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 イネイト終了後側管からフラッシュ</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 22時のシタピン終了後側管からフラッシュ</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 デキサイト注射液 6.6mg … 5瓶 (30)分点滴</p>	
		<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連速院内渡し分 レスパシコブ錠 10mg … 5錠 ロシタピン錠 60mg (武田チナ) … 1錠 リツキシマブ開始30分前に内服</p>	<p>■---【処置】</p> <p>フルボ点眼液 (0.1%) 5mL/本 … 1本 1日(4)回 両眼に点眼 シタリン点滴終了翌日まで両眼に点眼してください。</p>				
<p>リツキシマブ:375mg/m² d1(投与速度は添付文書の規定に従う) IFM:100mg/m² d2-4 DEXA:39.8mg/body d2-5 VP-16:150mg/m² d2-4 Ars-C:750mg*2回/mf d3-4</p>							