

		Day1	Day4	Day8	Day11	クール終了日 Day21	
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>グイーンF輸液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで</p> <p>プレドニ[水溶性]50mg … 2管 生理食塩液 20mL … 1管 リツキサン投与前に 側管より ゆっくり</p> <p>リツキシマブBS注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) 25 mL/h (30)分点滴 50 mL/h (30)分点滴 以降、30分毎に(25)mL/hずつ上げる 最大200mL/hまで 側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 リツキシマブ投与後のフラッシュ用 全開で点滴可 側管より</p> <p>グラニセロン点滴静注バッグ 3mg[HK] … 1袋 側管より 30分点滴</p> <p>ドキシルピシン塩酸塩注【化療】 生理食塩液 50mL … 1瓶 側管より 全開で</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 側管より 全開で点滴可 ドキシルピシン投与後のフラッシュ用</p> <p>エンドキサン注【化療】 生理食塩液 250mL … 1袋 側管より 1時間点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 側管より 全開で点滴可 エンドキサン投与後のフラッシュ用</p> <p>ヘルケイド皮下注【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 ゆっくり 腹部もしくは大腿部に</p>	<p>■---【注射】</p> <p>ヘルケイド皮下注【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 ゆっくり 腹部もしくは大腿部に</p>	<p>■---【注射】</p> <p>ヘルケイド皮下注【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 ゆっくり 腹部もしくは大腿部に</p>	<p>■---【注射】</p> <p>ヘルケイド皮下注【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 ゆっくり 腹部もしくは大腿部に</p>		
		<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコート錠 10mg … 5錠 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田7ハ」 … 1錠</p>					
		<p>■---【投薬】</p> <p>【5mg】プレドニゾン錠「タケダ」…1回 10錠 1日2回 朝・昼 食後 2日目から5日目までの4日間内服してください。</p>					
		<p>リツキサン:375mg/m² d1 DXR:50mg/m² d1 CPA:750mg/m² d1 Bor:1.3mg/m² d1,4,8,11 PSL:100mg/body d1(div.) d2-5(po.)</p>					

