

				クール終了日
		Day1	Day15	Day28
抗がん剤	注射・内服・処置	<b>■---【注射】</b> 生理食塩液 250mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで  生理食塩液 100mL … 1瓶 ファモチジン静注 20mg「日新」20mL … 1管 テキサート注射液 6.6mg … 1瓶 15分点滴 エムプリシティ投与60分前に開始 側管から  生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管から  <b>エムプリシティ【化療】</b> 注射用水 100mL … 1瓶 生理食塩液 250mL … 1瓶 120 ml/h 側管から  生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管から	<b>■---【注射】</b> 生理食塩液 250mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで  生理食塩液 100mL … 1瓶 ファモチジン静注 20mg「日新」20mL … 1管 テキサート注射液 6.6mg … 1瓶 15分点滴 エムプリシティ投与60分前に開始 側管から  生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管から  <b>エムプリシティ【化療】</b> 注射用水 100mL … 1瓶 生理食塩液 250mL … 1瓶 120 ml/h 側管から  生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管から	
		<b>■---【投薬】</b> (毒・C)レプラミドカプセル 5mg【化療】 … 5C 1日 夕 食後 1日目の夕食後から内服開始してください。 3週内服1週休薬 レナテックス錠 4mg … 7錠 1日 朝 食後  エムプリシティ点滴当日のみ朝に内服してください。 ( 月 日)と次コースの点滴1日目の朝に内服してください。 レナテックス錠 4mg … 10錠 1日 朝 食後 エムプリシティ投与1週間後の朝のみ内服してください。 ( 月 日)( 月 日)		
		<b>■---【処置】</b> 外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠 カロナール錠 500mg … 1錠	<b>■---【処置】</b> 外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠 カロナール錠 500mg … 1錠	
エロツズマブ:10mg/kg d1,15(点滴時間は添付文書の規定に従う) レナリドミド:25mg/body d1-21 Dex:36mg/body(28mg内服+8mg静注)d1,15 40mg/body(内服) d8,22				