							クール 日
		Day0	Day1	Day2	Day3	Day4	Day21
		持続 ソルデム3A 500mL … 1袋 重ソー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴	30分点滴 メソトレキセート注(200mg・1g用)【化療】	持続 ソルデム3A 500mL・・・1袋 重ソー静注7% 20mL (炭酸水素Na)・・・1管 (4)時間点滴 メインルート	重ソー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4) 時間点滴	■【注射】 持続 ソルテ・ム3A 500mL ··· 1袋 重ソー静注7% 20mL (炭酸水素Na) ··· 1管 (4)時間点滴 メインルート 4本中1本目	
			10時 静脈内注射 … 1 ツル・外 [*] ロール静注用 40mg(溶解液付) … 1.25瓶 生理食塩液 20mL … 1管	持続 ソルデム3A 500mL ··· 1袋 重ソー静注7% 20mL (炭酸水素Na) ··· 1管 (4)時間点滴 メインルート	持続 けんデ [*] ム3A 500mL … 1袋	持続 ソルテ・ム3A 500mL … 1袋	
			生理食塩液 500mL … 1袋 (22)時間点滴 12時	ソルデム3A 500mL … 1袋 重ソー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴		持続 ソルテ、ム3A 500mL ··· 1袋 重ソー静注7% 20mL (炭酸水素Na) ··· 1管 (4)時間点滴 メインルート	
			生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 メソトレキセート投与後のフラッシュ用	6本中3本目 持続	6本中3本目 持続	4本中3本目 持続	
			静脈内注射 … 1 ツル・外 ロール静注用 40mg(溶解液付) … 1.25瓶	重ソー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4) 時間点滴 メインルート	重ソー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管(4)時間点滴 メインルート	ソルデム3A 500mL ··· 1袋 重ソー静注7% 20mL (炭酸水素Na) ··· 1管 (4)時間点滴 メインルート 4本中4本目	
			持続 ソルテ・ム3A 500mL ・・・ 1袋 重ソー静注7% 20mL (炭酸水素Na)・・・ 1管 (4)時間点滴 メインルート	ソルデム3A 500mL ··· 1袋 重ソー静注7% 20mL (炭酸水素Na) ··· 1管 (4)時間点滴 メインルート	ソルデム3A 500mL ··· 1袋 重ソー静注7% 20mL (炭酸水素Na) ··· 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中5本目	静脈内注射 … 1 ロイコポリン注 3mg … 5管 4時 静脈内注射 … 1 ロイコポリン注 3mg … 5管	
			持続 ソルデム3A 500mL・・・1袋 重ソー静注7% 20mL(炭酸水素Na)・・・1管 (4)時間点滴 メインルート	ソルデム3A 500mL … 1袋 重ソー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メインルート	持続点滴 … 1 ソルデム3A 500mL … 1袋	10時 静脈内注射 … 1 ロイコホ・リン注 3mg … 5管 16時	
			ソルテ゛ム3A 500mL ··· 1袋	ロイコホ゛リン注 3mg ··· 5管	静脈内注射 … 1 ロイコホ・リン注 3mg (用時購入) … 5管 4時		
				ソル・外゛ロール静注用 40mg(溶解液付) …	静脈内注射 … 1 ロイコホ・リン注 3mg (用時購入) … 5管 10時		
抗がん剤	注射•内服·処置		持続 ソルテ・ム3A 500mL … 1袋 重ソー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メインルート 6本中4本目	10時のシタラビン投与前シタラビン【化療】 生理食塩液 500mL … 1袋 (3)時間点滴 10時	静脈内注射 … 1 ロイコボリン注 3mg (用時購入) … 5管 16時 静脈内注射 … 1 ロイコボリン注 3mg (用時購入) … 5管 22時		
			重ソー静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メインルート	生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 10時のシタラビン投与後のフラッシュ用	静脈内注射 … 1 ソル・外・ロール静注用 40mg(溶解液付) … 1.25瓶 生理食塩液 20mL … 1管 側管より		
			持続	ソル・外・ロール静注用 40mg(溶解液付) … 1.25瓶 生理食塩液 20mL … 1管 22時のシタラヒン投与前	10時のシタラヒン投与前 点滴 … 1 シタラビン【化療】… 999mg 生理食塩液 500mL … 1袋 (3)時間点滴		
				シタラビン【化療】 生理食塩液 500mL … 1袋 (3)時間点滴	側管より 10時 点滴 ··· 1		
				生理食塩液 50mL … 1瓶	生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 側管より 10時のシタラヒン投与後のフラッシュ用		
				22時のシタラビン投与後のフラッシュ用	静脈内注射 … 1 ソル・外・ロール静注用 40mg(溶解液付) … 1.25瓶 生理食塩液 20mL … 1管 側管より 22時のシタラヒン投与前		
					点滴 … 1 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 側管より 22時のシタラビン投与後のフラッシュ用		
		ダイアモックス錠 250mg ··· 1錠 1日2回 朝・夕 食後	アプレピタントカプセル 125mg「サワイ」… 1C メソトレキセート投与1時間前に内服してくださ				
		メソトレキセート投与前日の夕食後から内服開始 4日	1日	2日 フル外ロン点眼液(0.1%)5mL/本 … 1本 1日(4)回 両眼に点眼 抗がん剤点滴終了の翌日まで点眼してく ださい(day2~day4)			