

		Day0	Day1	Day2	Day3	Day4	Day21
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>持続 ヴルデム3A 500mL … 1袋 重ゾ静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メンルト</p>	<p>■---【注射】</p> <p>ハロキシド点滴静注バッグ 0.75mg … 1袋 30分点滴</p> <p>メトキシド注(200mg・1g用)【化療】 生理食塩液 100mL … 1瓶 (2)時間点滴 10時</p> <p>静脈内注射 … 1 ヴル・ドロール静注用 40mg(溶解液付) … 1.25瓶 生理食塩液 20mL … 1管 10時に</p> <p>メトキシド注(200mg・1g用)【化療】 生理食塩液 500mL … 1袋 (22)時間点滴 12時</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 メトキシド投与後のフラッシュ用</p> <p>静脈内注射 … 1 ヴル・ドロール静注用 40mg(溶解液付) … 1.25瓶 生理食塩液 20mL … 1管 22時に</p> <p>持続 ヴルデム3A 500mL … 1袋 重ゾ静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メンルト 6本中1本目</p> <p>持続 ヴルデム3A 500mL … 1袋 重ゾ静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メンルト 6本中2本目</p> <p>持続 ヴルデム3A 500mL … 1袋 重ゾ静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メンルト 6本中3本目</p> <p>持続 ヴルデム3A 500mL … 1袋 重ゾ静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メンルト 6本中4本目</p> <p>持続 ヴルデム3A 500mL … 1袋 重ゾ静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メンルト 6本中5本目</p> <p>持続 ヴルデム3A 500mL … 1袋 重ゾ静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メンルト 6本中6本目</p> <p>静脈内注射 … 1 ロイコリン注 3mg … 5管 22時</p> <p>静脈内注射 … 1 ヴル・ドロール静注用 40mg(溶解液付) … 1.25瓶 生理食塩液 20mL … 1管 10時のシタビド投与前</p> <p>シタビド【化療】 生理食塩液 500mL … 1袋 (3)時間点滴 10時</p> <p>持続 ヴルデム3A 500mL … 1袋 重ゾ静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メンルト 6本中4本目</p> <p>持続 ヴルデム3A 500mL … 1袋 重ゾ静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メンルト 6本中5本目</p> <p>持続 ヴルデム3A 500mL … 1袋 重ゾ静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メンルト 6本中6本目</p> <p>シタビド【化療】 生理食塩液 500mL … 1袋 (3)時間点滴 10時</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 10時のシタビド投与後のフラッシュ用</p>	<p>■---【注射】</p> <p>持続 ヴルデム3A 500mL … 1袋 重ゾ静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メンルト 6本中1本目</p> <p>持続 ヴルデム3A 500mL … 1袋 重ゾ静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メンルト 6本中2本目</p> <p>持続 ヴルデム3A 500mL … 1袋 重ゾ静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メンルト 6本中3本目</p> <p>持続 ヴルデム3A 500mL … 1袋 重ゾ静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メンルト 6本中4本目</p> <p>持続 ヴルデム3A 500mL … 1袋 重ゾ静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メンルト 6本中5本目</p> <p>持続 ヴルデム3A 500mL … 1袋 重ゾ静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メンルト 6本中6本目</p> <p>静脈内注射 … 1 ロイコリン注 3mg … 5管 22時</p> <p>静脈内注射 … 1 ヴル・ドロール静注用 40mg(溶解液付) … 1.25瓶 生理食塩液 20mL … 1管 10時のシタビド投与前</p> <p>シタビド【化療】 生理食塩液 500mL … 1袋 (3)時間点滴 10時</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 10時のシタビド投与後のフラッシュ用</p>	<p>■---【注射】</p> <p>持続 ヴルデム3A 500mL … 1袋 重ゾ静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メンルト 6本中1本目</p> <p>持続 ヴルデム3A 500mL … 1袋 重ゾ静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メンルト 6本中2本目</p> <p>持続 ヴルデム3A 500mL … 1袋 重ゾ静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メンルト 6本中3本目</p> <p>持続 ヴルデム3A 500mL … 1袋 重ゾ静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メンルト 6本中4本目</p> <p>持続 ヴルデム3A 500mL … 1袋 重ゾ静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メンルト 6本中5本目</p> <p>持続 ヴルデム3A 500mL … 1袋 重ゾ静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メンルト 6本中6本目</p> <p>静脈内注射 … 1 ロイコリン注 3mg (用時購入) … 5管 4時</p> <p>静脈内注射 … 1 ロイコリン注 3mg (用時購入) … 5管 10時</p> <p>静脈内注射 … 1 ロイコリン注 3mg (用時購入) … 5管 22時</p> <p>静脈内注射 … 1 ヴル・ドロール静注用 40mg(溶解液付) … 1.25瓶 生理食塩液 20mL … 1管 10時のシタビド投与前</p> <p>点滴 … 1 シタビド【化療】 … 999mg 生理食塩液 500mL … 1袋 (3)時間点滴 側管より</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 側管より 10時のシタビド投与後のフラッシュ用</p> <p>静脈内注射 … 1 ヴル・ドロール静注用 40mg(溶解液付) … 1.25瓶 生理食塩液 20mL … 1管 側管より 22時のシタビド投与前</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 側管より 22時のシタビド投与後のフラッシュ用</p>	<p>■---【注射】</p> <p>持続 ヴルデム3A 500mL … 1袋 重ゾ静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メンルト 4本中1本目</p> <p>持続 ヴルデム3A 500mL … 1袋 重ゾ静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メンルト 4本中2本目</p> <p>持続 ヴルデム3A 500mL … 1袋 重ゾ静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メンルト 4本中3本目</p> <p>持続 ヴルデム3A 500mL … 1袋 重ゾ静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メンルト 4本中4本目</p> <p>持続 ヴルデム3A 500mL … 1袋 重ゾ静注7% 20mL (炭酸水素Na) … 1管 (4)時間点滴 メンルト 4本中5本目</p> <p>静脈内注射 … 1 ロイコリン注 3mg … 5管 4時</p> <p>静脈内注射 … 1 ロイコリン注 3mg … 5管 10時</p> <p>静脈内注射 … 1 ロイコリン注 3mg … 5管 16時</p>	
		<p>■---【投薬】</p> <p>ダイアモクス錠 250mg … 1錠 1日2回 朝・夕 食後 メトキシド投与前日の夕食後から内服開始 4日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>アプレピントカサセル 125mg(サワイ) … 1C フラッシュ用 1日 フルドロ点眼液(0.1%)5mL/本 … 1本 1日(4)回 両眼に点眼 抗がん剤点滴終了の翌日まで点眼してください(day2~day4)</p>				
<p>MTX:200mg/m² d1 MTX:800mg/m² d1 Ara-C:3g/m² d2-3 21日毎</p>							