

		Day1	Day8	Day15	クール終了日 Day28
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【投薬】</p> <p>プレドニゾン錠5mg【化療】 1日 朝食後 治療開始1日目から14日目まで内服してください。 ( 月 日 ~ 月 日 ) 14日 プレドニゾン錠(5mg) … 4錠 1日 朝食後 治療開始から15, 16日目に内服してください。 ( 月 日、月 日 ) 2日 プレドニゾン錠(5mg) … 2錠 1日 朝食後 治療開始から17, 18日目に内服してください。 ( 月 日、月 日 ) 2日 プレドニゾン錠(5mg) … 1錠 1日 朝食後 治療開始から19, 20, 21日目に内服してください。 ( 月 日 ~ 月 日 ) 3日</p>	<p>■---【注射】</p> <p>リユーケンF注 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで</p> <p>グラニセロン点滴静注バッグ 3mg「HK」 … 1袋 30分点滴</p> <p>静脈内注射 … 1 オンビン【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 ゆっくり 禁血管外漏出</p> <p>エンドキサン注【化療】 生理食塩液 250mL … 1袋 1時間点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p> <p>筋注 … 1 ロイナーゼ【化療】[筋注用] 5%ブドウ糖液 20ml … 1管 ゆっくり</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 メインルートで点滴終了まで</p> <p>静脈内注射 … 1 オンビン【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 ゆっくり 禁血管外漏出</p> <p>筋注 … 1 ロイナーゼ【化療】[筋注用] 5%ブドウ糖液 20ml … 1管 ゆっくり</p>	
		<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 メインルートで点滴終了まで</p> <p>静脈内注射 … 1 オンビン【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 ゆっくり 禁血管外漏出</p> <p>筋注 … 1 ロイナーゼ【化療】[筋注用] 5%ブドウ糖液 20ml … 1管 ゆっくり</p>			
		<p>VCR:1.5mg/m<sup>2</sup>(max2mg/body) d1,8,15 CPA:600mg/m<sup>2</sup> d8 L-ASP:10000U/m<sup>2</sup> d1,8,15 PSL:40mg/m<sup>2</sup> d1-14(以降、1週間かけてtepering) 28日毎</p>			