

					クール終了日
		Day1	Day8	Day15	Day28
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【投薬】 プレドニゾン錠5mg【化療】 1日 朝 食後 治療開始1日から14日目まで内服してください。 (月 日～ 月 日) 14日 プレドニゾン錠(5mg) … 4錠 1日 朝 食後 治療開始から15, 16日目に内服してください。 (月 日、 月 日) 2日 プレドニゾン錠(5mg) … 2錠 1日 朝 食後 治療開始から17, 18日目に内服してください。 (月 日、 月 日) 2日 プレドニゾン錠(5mg) … 1錠 1日 朝 食後 治療開始から19, 20, 21日目に内服してください。 (月 日～ 月 日) 3日	■---【注射】 ソリュケンF注 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで グラニセロン点滴静注バッグ 3mg「HK」 … 1袋 30分点滴 静脈内注射 … 1 オンコビン【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 ゆっくり 禁血管外漏出 テラルビシン【化療】 生理食塩液 100mL … 1瓶 1時間点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 筋注 … 1 ロイナセ【化療】[筋注用] 5% ブドウ糖液 20ml … 1管 ゆっくり	■---【注射】 生理食塩液 100mL … 1瓶 メインルートで点滴終了まで 静脈内注射 … 1 オンコビン【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 ゆっくり 禁血管外漏出 筋注 … 1 ロイナセ【化療】[筋注用] 5% ブドウ糖液 20ml … 1管 ゆっくり	
		生理食塩液 100mL … 1瓶 メインルートで点滴終了まで 静脈内注射 … 1 オンコビン【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 ゆっくり 禁血管外漏出 筋注 … 1 ロイナセ【化療】[筋注用] 5% ブドウ糖液 20ml … 1管 ゆっくり			
		VCR:1.5mg/㎡ d1,8,15 THP:25mg/㎡ d8 L-ASP:10000U/㎡ d1,8,15 PSL:40mg/㎡ d1-14(以降、1週間かけてtepering) 28日毎			