

FLU+BU (RIC)

		Day1	Day2	Day3	Day4	Day5
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【注射】 グラニセロン点滴静注バッグ® 3mg「HK」 … 1袋 30分点滴 12時30分 フルダラ【化療】 注射用水 20mL … 1管 生理食塩液 100mL … 1瓶 30分点滴 13時 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■---【注射】 グラニセロン点滴静注バッグ® 3mg「HK」 … 1袋 30分点滴 12時30分 フルダラ【化療】 注射用水 20mL … 1管 生理食塩液 100mL … 1瓶 30分点滴 13時 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■---【注射】 パロセロン点滴静注バッグ® 0.75mg … 1袋 30分点滴 プスルフェクス注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) (3)時間点滴 10時 フルダラ【化療】 注射用水 20mL … 1管 生理食塩液 100mL … 1瓶 30分点滴 13時 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■---【注射】 プスルフェクス注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) (3)時間点滴 10時 フルダラ【化療】 注射用水 20mL … 1管 生理食塩液 100mL … 1瓶 30分点滴 13時 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■---【注射】 フルダラ【化療】 注射用水 20mL … 1管 生理食塩液 100mL … 1瓶 30分点滴 13時 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可
				■---【投薬】 アプレビタントカプセル 125mg「サワイ」 … 1C 1日 化学療法開始60分前に内服してください 1日	■---【投薬】 アプレビタントカプセル 80mg「サワイ」 … 1C 1日 朝 食後 4日	

FLU:30mg/m² d1-5
 BU:3.2mg/kg d3,4
 移植前で終了