

		クール終了日	
		Day1	Day21
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 プレドニ[水溶性]50mg … 2管 30分点滴 ガザイハ開始60分前に 側管から</p> <p>ガザイハ点滴静注【化療】 … 1000mg 生理食塩液 250mL … 0.84瓶 12.5 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(12.5)mL/hずつ上げる 最大100ml/hまで 側管から</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 ガザイハのフラッシュ用 全開で点滴可 側管から</p> <p>グラニセロン点滴静注液3mgバッグ「アイロム」 … 1袋 30分点滴 側管から ルート変更(閉鎖式ルートを使用)</p> <p>オンコピン【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 ゆっくり 側管から 禁血管外漏出</p> <p>ドキシルビシン塩酸塩注【化療】 生理食塩液 50mL … 1瓶 全開で点滴 側管から</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 ドキシルビシンのフラッシュ用 全開で点滴可 側管から</p> <p>エンドキサン注【化療】 生理食塩液 250mL … 1瓶 (60)分点滴 側管から</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 エンドキサンのフラッシュ用 全開で点滴可 側管から</p>	
		<p>■---【投薬】</p> <p>プレドニゾロン錠(5mg) … 20錠 1日 朝食後 抗がん剤点滴翌日から4日間内服してください。</p>	
		<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」 … 1錠</p>	
<p>オビヌツズマブ:1000mg/body d1(点滴時間は添付文書の規定に従う) PSL:100mg/body(静注)d1, 100mg/body(内服) d2-5 VCR:1.4mg/m² d1 DXR:50mg/m² d1 CPA:750mg/m² d1</p>			