

			クール終了日
		Day1	Day21
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【注射】 生理食塩液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで 生理食塩液 100mL … 1瓶 プレドニン〔水溶性〕50mg … 2管 30分点滴 ガザイハ開始60分前に 側管から ガザイハ点滴静注【化療】 … 1000mg 生理食塩液 250mL … 0.84瓶 12.5 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(12.5)mL/hずつ上げる 最大100ml/hまで 側管から 生理食塩液 50mL … 1瓶 ガザイハのフラッシュ用 全開で点滴可 側管から グラニセトン点滴静注3mgパック「アイロム」 … 1袋 30分点滴 側管から オンコビン【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 ゆっくり 側管から エントキサン注【化療】 生理食塩液 250mL … 1瓶 (60)分点滴 側管から 生理食塩液 50mL … 1瓶 エントキサンのフラッシュ用 全開で点滴可 側管から	
		■---【投薬】 プレドニゾン錠(5mg) … 20錠 1日 朝 食後 抗がん剤点滴翌日から4日間内服してください。	
		■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」 … 1錠	
		オビヌツズマブ:1000mg/body d1(点滴時間は添付文書の規定に従う) PSL:100mg/body(静注) d1, 100mg/body(内服) d2-5 VCR:1.4mg/m ² d1 CPA:750mg/m ² d1	