

E-Pd(#3以降)

			ケール終了日
		Day1	Day28
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【注射】 生理食塩液 250mL … 1瓶 メインルートで点滴終了まで 生理食塩液 50mL … 1瓶 ファモチジン静注 20mg「日新」 20mL … 1管 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 15分点滴 エムフリシティ投与60分前に開始 側管から 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管から エムフリシティ【化療】 注射用水 100mL … 1瓶 生理食塩液 250mL … 1瓶 180ml/h 30分点滴 240ml/h 30分点滴 以後、300ml/hで点滴 側管から 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管から	
		■---【投薬】 ホマリсткаプセル【化療】 1日 夕 食後 1日目の夕食後から内服開始してください。 3週内服1週休薬 レナテックス錠 4mg … 7錠 1日 朝 食後 次のコースのエムフリシティ点滴当日の朝に内服してください。 レナテックス錠 4mg … 10錠 1日 朝 食後 エムフリシティ投与後8日目、15日目、22日目の朝のみ内服してください。 (月 日)(月 日)(月 日)	
		■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコフ錠 10mg … 3錠 カロナル錠 500mg … 1錠 前投薬開始時に内服してください。	
	エロツズマブ:20mg/kg d1(点滴時間は添付文書の規定に従う) ボマリドミド:4mg/body d1-21 Dex:36mg/body(28mg内服+8mg静注)d1, 40mg(内服)d8,15,22		