

		クール終了日
		Day1
		Day21
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【投薬】</p> <p>プレドニゾン錠(5mg) … 20錠 1日 朝食後 点滴の翌日から必ず4日間服用してください。</p>
		<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで</p> <p>グラニセロン点滴静注液3mgバッグ「アイロム」 … 1袋 プレドニン〔水溶性〕50mg … 2管 生理食塩液 5mL(溶解用) … 1管 (30)分点滴 側管より</p> <p>ドキシルピシン塩酸塩注【化療】 生理食塩液 50mL … 1瓶 全開で点滴可 側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 ドキシルピシン投与後 側管より</p> <p>エンドキサン注【化療】 生理食塩液 250mL … 1瓶 (60)分点滴 側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 エンドキサン投与後 側管より</p> <p>アトセトリス【化療】 注射用水 100mL … 1瓶 生理食塩液 100mL … 1瓶 30分点滴 側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 アトセトリス投与後 側管より</p>
<p>ブレンツキシマブ・ベドチン:1.8mg/kg d1 DXR:50mg/m² d1 CPA:750mg/m² d1 PSL:100mg/body d1-5</p>		