

						クール終了日
		Day1	Day2	Day3	Day4	Day28
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【注射】 ウィーンF輸液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで リツキシマブBS注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) 25 ml/h (30)分点滴 50 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(25)mL/hずつ上げる 最大200ml/hまで 側管から 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管から	■---【注射】 ウィーンF輸液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで グラニセロン点滴静注バッグ 3mg「HK」 … 1袋 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 (30)分点滴 側管から トリアキシン点滴静注液【化療】 生理食塩液 250mL … 1袋 (1)時間点滴 側管から 生理食塩液 100mL … 1瓶 (1)時間点滴 トリアキシン投与後 側管から シタラビン【化療】 生理食塩液 250mL … 1袋 (2)時間点滴 トリアキシン開始から2時間後に投与開始 側管から 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管から	■---【注射】 ウィーンF輸液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで グラニセロン点滴静注バッグ 3mg「HK」 … 1袋 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 (30)分点滴 側管から トリアキシン点滴静注液【化療】 生理食塩液 250mL … 1袋 (1)時間点滴 側管から 生理食塩液 100mL … 1瓶 (1)時間点滴 トリアキシン投与後 側管から シタラビン【化療】 生理食塩液 250mL … 1袋 (2)時間点滴 トリアキシン開始から2時間後に投与開始 側管から 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管から	■---【注射】 ウィーンF輸液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで グラニセロン点滴静注バッグ 3mg「HK」 … 1袋 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 (30)分点滴 側管から シタラビン【化療】 生理食塩液 250mL … 1袋 (2)時間点滴 側管から 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管から	
		■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」 … 1錠 リツキシマブ開始30分前に内服	■---【投薬】 フルメロン点眼液(0.1%)5mL/本 … 1本 1日(4)回 両眼に点眼 2日目から5日目まで点眼してください。			
リツキシマブ:375mg/㎡ d1(投与速度は添付文書の規定に従う) Bendamustine:70mg/㎡ d2-3 Ara-C:800mg/㎡ d2-4						