

		Day1	Day8	Day15	Day22	クール終了日 Day28
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」 … 1錠	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」 … 1錠	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」 … 1錠	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」 … 1錠	
		■---【注射】 ウィーンF輸液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで リツキシマブBS注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) 25 ml/h (30)分点滴 50 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(25)mL/hずつ上げる 最大200mL/hまで	■---【注射】 ウィーンF輸液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで リツキシマブBS注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) 25 ml/h (30)分点滴 50 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(25)mL/hずつ上げる 最大200mL/hまで	■---【注射】 ウィーンF輸液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで リツキシマブBS注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) 25 ml/h (30)分点滴 50 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(25)mL/hずつ上げる 最大200mL/hまで	■---【注射】 ウィーンF輸液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで リツキシマブBS注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) 25 ml/h (30)分点滴 50 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(25)mL/hずつ上げる 最大200mL/hまで	
		生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管より	生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管より	生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管より	生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管より	
		■---【投薬】 (毒・C)レプラミドカプセル 5mg【化療】…1回 4C 1日 夕食後 抗がん剤1日目の夕食後から内服を開始してください。 21日				
リツキシマブ:375mg/m ² d1,8,15,22(#1), d1(#2~5)(時間は添付文書の規定に従う) レナリドミド:20mg/body d1-21						