JALSG ALL202-U Induction therapy(dB～)

																			クール終了日
		Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day10	Day12	Day14	Day15	Day16	Day18	Day20	Day22	Day28
抗がん剤	注射・内服・局置	■――【注射】 ハロペリドール点滴静注ﾊﾝﾌﾟ 0.75mg ･･･ 1袋 ドキサート注【化療】 1時間点滴 静脈内注射 ･･･ 1 オンコン【化療】 生理食塩液 20mL ･･･ 1管 緊急管外漏出 ゆっくり ドラベシン【化療】 生理食塩液 100mL ･･･ 1瓶 1時間点滴 生理食塩液 50mL ･･･ 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 髄注 ･･･ 1 メソレキート髄注用【化療】･･･ 12mg ｻｲﾄﾃﾞｨﾝ【化療】･･･ 20mg 1lｺｰﾅｰ注射用 100mg ･･･ 0.25瓶 生理食塩液　mL用（注射用）･･･ 1mL	■――【注射】 生理食塩液 100mL ･･･ 1瓶 ドキサート注【化療】 1時間点滴 ドラベシン【化療】 生理食塩液 100mL ･･･ 1瓶 1時間点滴 生理食塩液 50mL ･･･ 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■――【注射】 生理食塩液 100mL ･･･ 1瓶 ドキサート注【化療】 1時間点滴 エンドキサン注【化療】 生理食塩液 200mL ･･･ 1袋 1時間点滴 生理食塩液 50mL ･･･ 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■――【注射】 生理食塩液 100mL ･･･ 1瓶 ドキサート注【化療】 1時間点滴	■――【注射】 生理食塩液 100mL ･･･ 1瓶 ドキサート注【化療】 1時間点滴	■――【注射】 生理食塩液 100mL ･･･ 1瓶 ドキサート注【化療】 1時間点滴	■――【注射】 生理食塩液 100mL ･･･ 1瓶 ドキサート注【化療】 1時間点滴	■――【注射】 生理食塩液 50mL ･･･ 1瓶 &ｰ1級度用 静脈内注射 ･･･ 1 オンコン【化療】 生理食塩液 20mL ･･･ 1管 緊急管外漏出 ゆっくり 皮内注射 ･･･ 1 注射用水 20mL ･･･ 1管 生理食塩液 20mL ･･･ 1管 初回皮内反応試験用 5%ブドウ糖液　50mL ･･･ 1瓶 プライミング用 ロイナ-ヤ【化療】静注用 注射用水 20mL ･･･ 1管 5%ブドウ糖注ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾗｰ 500mL ･･･ 1袋 (4)時間点滴 5%ブドウ糖液　50mL ･･･ 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■――【注射】 5%ブドウ糖液　50mL ･･･ 1瓶 プライミング用 ロイナ-ヤ【化療】静注用 注射用水 20mL ･･･ 1管 5%ブドウ糖注ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾗｰ 500mL ･･･ 1袋 (4)時間点滴 5%ブドウ糖液　50mL ･･･ 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■――【注射】 5%ブドウ糖液　50mL ･･･ 1瓶 プライミング用 ロイナ-ヤ【化療】静注用 注射用水 20mL ･･･ 1管 5%ブドウ糖注ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾗｰ 500mL ･･･ 1袋 (4)時間点滴 5%ブドウ糖液　50mL ･･･ 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■――【注射】 生理食塩液 50mL ･･･ 1瓶 &ｰ1級度用 静脈内注射 ･･･ 1 オンコン【化療】 生理食塩液 20mL ･･･ 1管 緊急管外漏出 ゆっくり 髄注 ･･･ 1 メソレキート髄注用【化療】･･･ 12mg ｻｲﾄﾃﾞｨﾝ【化療】･･･ 30mg 1lｺｰﾅｰ注射用 100mg ･･･ 0.25瓶 生理食塩液　mL用（注射用）･･･ 1mL	■――【注射】 5%ブドウ糖液　50mL ･･･ 1瓶 プライミング用 ロイナ-ヤ【化療】静注用 注射用水 20mL ･･･ 1管 5%ブドウ糖注ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾗｰ 500mL ･･･ 1袋 (4)時間点滴 5%ブドウ糖液　50mL ･･･ 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■――【注射】 5%ブドウ糖液　50mL ･･･ 1瓶 プライミング用 ロイナ-ヤ【化療】静注用 注射用水 20mL ･･･ 1管 5%ブドウ糖注ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾗｰ 500mL ･･･ 1袋 (4)時間点滴 5%ブドウ糖液　50mL ･･･ 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■――【注射】 5%ブドウ糖液　50mL ･･･ 1瓶 プライミング用 ロイナ-ヤ【化療】静注用 注射用水 20mL ･･･ 1管 5%ブドウ糖注ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾗｰ 500mL ･･･ 1袋 (4)時間点滴 5%ブドウ糖液　50mL ･･･ 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■――【注射】 生理食塩液 50mL ･･･ 1瓶 &ｰ1級度用 静脈内注射 ･･･ 1 オンコン【化療】 生理食塩液 20mL ･･･ 1管 緊急管外漏出 ゆっくり 5%ブドウ糖液　50mL ･･･ 1瓶 プライミング用 ロイナ-ヤ【化療】静注用 注射用水 20mL ･･･ 1管 5%ブドウ糖注ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾗｰ 500mL ･･･ 1袋 (4)時間点滴 5%ブドウ糖液　50mL ･･･ 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	
		■――【投薬】 アスピベンカロプ ﾃﾙ 125mg(ﾃﾞｼﾘｯﾄ) ･･･ 1C 化学療法時(朝)分割に 1日	■――【投薬】 アスピベンカロプ ﾃﾙ 80mg(ﾃﾞｼﾘｯﾄ) ･･･ 1C 1日 朝 食後 治療開始翌日から2日間内服してください 2日						■――【投薬】 フルドニプロン錠5mg【化療】 1日 朝 食後 （ 月 日）～（ 月 日） 14日								■――【投薬】 フレドニプロン錠(5mg) ･･･ 4錠 1日 朝 食後 治療開始から22日目と23日目に内服してください。 （ 月 日）（ 月 日） 2日 フレドニプロン錠(5mg) ･･･ 2錠 1日 朝 食後 治療開始から24日目と25日目に内服してください。 （ 月 日）（ 月 日） 2日 フレドニプロン錠(5mg) ･･･ 1錠 1日 朝 食後 治療開始26日目、27日目、28日目に内服してください。 （ 月 日）（ 月 日） 3日	
VCR:1.5mg/㎡(Max2mg) d1,8,15,22 · THP:25mg/㎡ d1,2 DPA:1200mg/㎡ d3 ｜L-ASP:6000IU/㎡ d6,10,12,14,16,18,20,22 MTX:ITI:12mg/body d1,15 PSL:60mg/㎡ d9-21(以後漸減) 28日毎																			